

STABLON® 12,5 mg

Tianeptine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient sérieux ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination
STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé.

Composition qualitative et quantitative

Tianeptine (sel de sodium) : 12,5 mg par comprimé. Excipient : D-mannitol, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium, éthylcellulose, oléate de glycérol, polyvidone excipient, carboxyméthylcellulose sodique, silice colloïdale anhydre, saccharose, polysorbate 80, dioxyde de titane, bicarbonate de sodium, cire d'abeille blanche.
Pour 1 comprimé.


Forme pharmaceutique

Boîte de 30 comprimés enrobés (blancs) sous plaquettes thermoformées

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTI-DEPRESSEUR

Nom et adresse de l'exploitant

 Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine

Nom et adresse du fabricant

Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 - Gidy

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans les états dépressifs d'intensité légère, modérée ou sévère.

3. ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament
Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- chez l'enfant de moins de 15 ans,
- en cas de grossesse ou d'allaitement,
- en association aux médicaments de la dépression de la classe des IMAO non sélectifs (voir rubrique interactions médicamenteuses et autres interactions).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde spéciales

L'utilisation prolongée et à fortes doses peut conduire à un état de dépendance. Ne pas dépasser la posologie recommandée.

Précautions d'emploi

Ne pas arrêter brutalement le traitement, mais diminuer la posologie pendant 7 à 14 jours. Si vous devez subir une anesthésie générale, il convient de prévenir l'anesthésiste réanimateur qui pourra arrêter le traitement 24 ou 48 heures avant l'intervention. Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

La prise de ce médicament associé à certains médicaments de la classe des IMAO (prescrits en cas de dépression) expose à des accidents très graves, en cas de relais d'un traitement par IMAO, respecter un délai de 15 jours.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse allaitement

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

Conducteurs et utilisateurs de machines

Chez certains patients une baisse de la vigilance est susceptible de se manifester. L'attention est donc attirée sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Saccharose (sucre) : environ 24 mg par comprimé, en tenir compte dans la ration journalière en cas de diabète ou en cas de régime sans sucre ou pauvre en sucre.
Cellulose, glycérol, bicarbonate de sodium.

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

La posologie recommandée est de 1 comprimé trois fois par jour, matin, midi et soir, au début des principaux repas.

Chez les sujets de plus de 70 ans et en cas d'insuffisance rénale, limiter la posologie à 2 comprimés par jour.

Ne pas arrêter le traitement sans l'avis de votre médecin.

Dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription de votre médecin.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré
Au début des principaux repas, matin, midi et soir.

Durée du traitement

Respecter la durée du traitement prescrite par le médecin.
En aucun cas, le traitement ne doit être prolongé sans avis médical.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Prendre l'avis du médecin pour la poursuite du traitement.

5. EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- maux d'estomac, douleurs abdominales, bouche sèche, perte de l'appétit, nausées, vomissements, constipation, flatulences,
 - insomnie, somnolence, cauchemars, fatigue,
 - palpitations, troubles cardiaques, douleurs de la région située devant le cœur,
 - vertiges, maux de tête, malaises, tremblements, bouffées de chaleur,
 - gêne respiratoire, boule dans la gorge,
 - douleurs musculaires ou articulaires.
- Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.**

6. CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

7. DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :

Janvier 2007.

02 312 59 01

