

## 2 FORMES DE CONTRACEPTION DOIVENT ÊTRE UTILISÉES ; 1 DE CHAQUE COLONNE

### MÉTHODES BARRIÈRES

- Préservatif masculin (avec spermicide, si possible) **OU**
- Diaphragme avec spermicide



### FORMES DE CONTRACEPTION HAUTEMENT EFFICACES

- Dispositif intra-utérin (DIU) **OU**
- Stérilisation tubulaire **OU**
- Vasectomie

#### Représentant local Sun Pharma :

- Téléphone : 01.39.62.10.24
- Fax : 01.39.62.55.29
- info.france@sunpharma.com



Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. © Sun Pharma 2017 10/17, V01-00  
Approbation ANSM : Janvier 2018 -Version 1.0

DHPC-Soni-2018-01-FR-b

## Carte aide-mémoire Odomzo® (sonidégeb) gélules pour les professionnels de santé

Odomzo® peut induire une mort embryofœtale ou des anomalies congénitales graves s'il est administré à une femme enceinte. Il a été démontré que les inhibiteurs de la voie Hedgehog sont embryotoxiques et/ou tératogènes chez les animaux. Odomzo® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.

Veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit ou contacter le représentant local Sun Pharma.

Odomzo® est contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante.

**Veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit pour des informations complètes sur la sécurité.**

## Rappelez les points suivants aux patients suivant un traitement par Odomzo® (sonidégib) gélules :

---

- **Ne débutez pas une grossesse.**
- **N'allaitez pas.**
- **Ne donnez pas votre** sperme.
- **Évitez** toute relation sexuelle non protégée, même si vous êtes une femme qui a subi une ligature des trompes **OU** si vous êtes un homme qui a subi une vasectomie.
- **Toute femme en âge de procréer doit toujours utiliser des méthodes contraceptives**, comme l'abstinence sexuelle **OU** 2 méthodes contraceptives recommandées.
- Les femmes doivent se soumettre à un test de grossesse dans les 7 jours avant le début du traitement par Odomzo® et tous les mois pendant le traitement.

---

**N'OUBLIEZ PAS DE CONSULTER ET DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE VERIFICATION DES CONSEILS D'ODOMZO® QUI SE TROUVE DANS LA BROCHURE DU PATIENT ODOMZO®.**

---

## N'oubliez pas de rappeler à vos patients de :

---

- **Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.**
- **Ne jamais donner de gélules** à toute personne autre qu'un professionnel de santé.
- **Retourner toute gélule non utilisée au terme du traitement à leur pharmacien.**
- **Ne pas donner leur sang pendant le traitement** et pendant au moins 20 mois après la dernière prise.

« Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez (coordonnées disponibles sur le site Internet de l'ANSM [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr) ou dans le Dictionnaire Vidal®) »