

Date :/...../.....

Complément explicatif de l'ordonnance médicale de :

Nom Prénom

Poids kg

Votre médecin vous a prescrit mg de SIKLOS® par jour.

Cela veut dire, prendre chaque jour :

Siklos® 100 mg

Chaque demi-comprimé est gravé d'un "H" sur une face

1/2 comprimé : **50 mg**



..... comprimé(s) entier(s) : 100 mg



Boîte couleur OR

Siklos® 1000 mg

Chaque quart de comprimé est gravé d'un "T" sur une face

1/4 comprimé : **250 mg**



1/2 comprimé : **500 mg**



3/4 comprimé : **750 mg**



..... comprimé(s) entier(s) : **1000 mg**



Boîte couleur ROUGE

Merci de bien vouloir présenter cette fiche à votre pharmacien avec l'ordonnance.

Avant de prendre votre traitement, lisez le guide d'information destiné aux patients drépanocytaires traités par SIKLOS® ; il contient des informations importantes sur SIKLOS® et notamment sur les précautions de manipulation des comprimés.



Guide délivré par votre médecin

ou téléchargeable :

<https://www.dropbox.com/s/tfclbiwskl53tpc/SIKRMP08FR%20Siklos%20guide%20patient.pdf?dl=0>

ou QR code (voir ci-contre)



Siklos[®]

hydroxycarbamide

Existe sous 2 dosages différents :


100 mg et 1000 mg

Comment utiliser les morceaux de comprimé de Siklos[®] d'un jour à l'autre ?

Si vous avez besoin de demi ou quart de comprimé, en fonction de la prescription médicale, les comprimés peuvent être facilement cassés.

Remettre les parties non utilisées du comprimé dans le flacon et ranger le flacon dans la boîte, elles peuvent être utilisées dans les 3 mois.

Siklos[®] 100 mg



Siklos[®] 1000 mg

