



# Caprelisa<sup>®</sup> ▼

## vandetanib

Pour plus d'information, **veuillez lire attentivement la notice** de Caprelisa, contenue dans la boîte ou sur la base de données publique des médicaments [www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr](http://www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr).

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observerez.

Consultez la rubrique « déclarer un effet indésirable » sur le site de l'ANSM [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

GUIDE POSOLOGIQUE ET  
DE SUIVI DES PATIENTS  
PÉDIATRIQUES DESTINÉ AUX  
PATIENTS ET AUX AIDANTS

## Qu'est-ce que Caprelisa et dans quels cas est-il utilisé ?

Caprelisa est un médicament dont le principe actif est le vandétanib. Il est disponible sous forme de comprimés pelliculés (100 et 300 mg). Il est utilisé pour traiter le cancer médullaire de la thyroïde qui ne peut être réséqué chirurgicalement ou qui a formé des métastases.

Caprelisa agit en ralentissant la croissance des nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs cancéreuses. Cela empêche l'apport d'oxygène et de nutriments à la tumeur. Caprelisa agirait également directement sur les cellules cancéreuses, en les tuant ou en freinant leur croissance.

## Comment la dose de Caprelisa est-elle calculée ?

Le calcul de la dose de vandétanib est fait par le médecin traitant, en se basant sur la surface corporelle (SC) de l'enfant/l'adolescent, qui dépend de la taille et du poids de celui-ci.

En fonction de la SC calculée, le médecin prescrira à votre enfant **une dose initiale**, qui peut être modifiée (ajustements de la dose) en :

- une **augmentation de dose** quand le vandétanib est bien toléré après 8 semaines de traitement à la dose initiale
- une **réduction de dose**, en cas d'effets indésirables, après une suspension du traitement (d'au moins une semaine)

La dose peut également être modifiée si la SC change au cours du traitement.

La dose quotidienne totale chez l'enfant ne doit pas dépasser 300 mg.

Le schéma posologique correspondra à l'une des trois posologies suivantes :

- schéma "quotidien" (même dose tous les jours : J1=J2=J3...)
- schéma "un jour sur deux" (même dose un jour sur deux : J1=J3=J5)
- schéma "7 jours" (traitement tous les jours, mais à deux doses différentes alternées : J1=J8)

**Veillez noter que le schéma posologique peut changer pendant le traitement.** Par exemple, on peut suivre un schéma quotidien pendant la période de dose initiale et passer à un schéma de 7 jours après un ajustement de dose.

Vous devez consigner chaque prise de dose sur un tableau de suivi journalier (voir ci-dessous).

### Comment Caprelisa est-il utilisé ?

La dose calculée prescrite doit être prise :

- à peu près à la même heure
- avec ou sans aliment

Si l'enfant a du mal à avaler le comprimé, celui-ci peut être dispersé dans de l'eau, comme suit :

- Prendre un demi-verre d'eau plate (non-gazeuse). Utiliser seulement de l'eau, pas d'autre liquide.
- Mettre le comprimé dans l'eau.
- Mélanger le comprimé jusqu'à ce qu'il soit dispersé dans l'eau. Cela peut prendre environ 10 minutes.
- Faire ensuite boire la solution à l'enfant, sans délai.

Pour s'assurer qu'il ne reste pas de médicament dans le verre, remettre de l'eau à mi-verre et refaire boire le contenu à l'enfant.

### Quels sont les effets indésirables associés à Caprelisa ? Quelle surveillance faut-il mettre en place ?

Comme vous l'a expliqué votre médecin spécialiste, vous pouvez avoir **certains effets indésirables graves** en prenant CAPRELSA®.

Les effets indésirables les plus fréquents du vandétanib sont : diarrhée, éruptions ou autres réactions cutanées, nausées, hypertension (tension artérielle excessive) et maux de tête.

Une surveillance du cœur et de la formule sanguine sera nécessaire AVANT, et régulièrement PENDANT le traitement par vandétanib, en particulier :

- les taux sanguins de potassium, calcium, magnésium et hormone thyroïdienne (TSH)
- l'activité électrique du cœur, au moyen d'un électrocardiogramme (ECG)

Une bonne protection de la peau est requise (port de vêtements couvrants, écran solaire), surtout si votre enfant est sensible au soleil.

Prévenez le médecin ou le pharmacien si votre enfant prend, a pris récemment ou doit prendre d'autres médicaments, y compris des médicaments vendus sans ordonnance et des produits de phytothérapie. Ils pourraient interagir avec le vandétanib et réduire son efficacité ou augmenter sa toxicité.

Vous devez signaler tous les effets indésirables au médecin qui suit votre enfant. Celui-ci pourra prescrire à votre enfant d'autres médicaments pour atténuer ces effets. Une suspension du traitement ou une réduction de la dose peut également s'avérer nécessaire.

Prévenez immédiatement le médecin de votre enfant si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants (votre enfant pourrait nécessiter un traitement médical urgent) :

- Malaise, vertiges ou modifications du rythme cardiaque. Ils peuvent être les signes d'une modification de l'activité électrique de votre cœur. Ils sont observés chez 8% des patients prenant Caprelso pour un cancer médullaire de la thyroïde. Votre médecin pourra vous recommander de prendre une dose plus faible ou d'arrêter Caprelso. Caprelso a été peu fréquemment associé à des modifications du rythme cardiaque engageant le pronostic vital.
- Réactions cutanées sévères affectant des surfaces étendues de votre corps. Les signes peuvent inclure une rougeur, une douleur, des ulcérations, des cloques et un détachement de la peau. Les lèvres, le nez, les yeux et les parties génitales peuvent également être atteints. Cela peut être fréquent (touchant moins d'1 personne sur 10) ou peu fréquent (touchant moins d'une personne sur cent) en fonction du type de réaction cutanée.
- Diarrhée sévère.
- Essoufflement grave ou aggravation subite d'un essoufflement, s'accompagnant éventuellement d'une toux ou d'une température élevée (fièvre). Cela peut signifier que vous avez une inflammation des poumons appelée « pneumopathie interstitielle ». Cet effet indésirable est peu fréquent (touchant moins d'1 personne sur 100) mais peut engager le pronostic vital.
- Convulsions, maux de tête, confusion ou difficultés à vous concentrer. Ils peuvent être les signes d'une affection appelée SLPR (syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible). Ils disparaissent habituellement après l'arrêt de Caprelso. Le SLPR est peu fréquent (touche moins d'1 personne sur 100).

Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez un des effets indésirables ci-dessus.

## Comment utiliser le tableau de suivi journalier ?

Au moment de prescrire la dose initiale, votre médecin remplira la "partie réservée au prescripteur" du tableau de suivi journalier et vous expliquera comment l'utiliser. Le tableau de suivi est fait pour vous aider à :




- vous rappeler quand prendre, ou donner à votre enfant, une nouvelle dose, et laquelle. Il doit être rempli par vos soins après chaque prise.
- signaler les effets indésirables et suivre les ajustements posologiques.

Le tableau de suivi journalier est **adapté à toutes les posologies**. Au cas où un changement de dose serait effectué, votre médecin vous remettra une nouvelle page de tableau de suivi.

Vous trouverez ci-après des copies vierges du tableau de suivi journalier (après des tableaux de suivi remplis à titre d'exemple).




Espace réservé au prescripteur		Tableau de suivi journalier pour le patient				
Poids : _____ Taille : _____ SC : _____ m <sup>2</sup> Date de prescription : _____ <input type="checkbox"/> Dose initiale <input type="checkbox"/> Augmentation de dose <input type="checkbox"/> Réduction de dose (voir les recommandations posologiques)		Nom du patient : _____ Date de naissance : _____ Si votre enfant oublie de prendre Caprelsa et que vous vous en apercevez: - 12 heures ou plus avant la dose suivante : prendre le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. - Moins de 12 heures avant la dose suivante: ne pas prendre ("sauter") la dose oubliée. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. NE PAS prendre une double dose (deux doses à la fois) pour compenser un oubli de dose.				
Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :	
Lundi J1						
Mardi J2						
Mercredi J3						
Jeudi J4						
Vendredi J5						
Samedi J6						
Dimanche J7						

Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :
Lundi J8					
Mardi J9					
Mercredi J10					
Jeudi J11					
Vendredi J12					
Samedi J13					
Dimanche J14					

Doses disponibles	Commentaires pour les patients et/ou les aidants (effets indésirables, autres traitements ou information importante)				
100 mg = 					
200 mg = 					
300 mg = 					

Espace réservé au prescripteur		Tableau de suivi journalier pour le patient					
Nom du patient : _____ Date de naissance : _____ Si votre enfant oublie de prendre Caprelsa et que vous vous en apercevez : -12 heures ou plus avant la dose suivante: prendre le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. - Moins de 12 heures avant la dose suivante: ne pas prendre ("sauter") la dose oubliée. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. NE PAS prendre une double dose (deux doses à la fois) pour compenser un oubli de dose.							
Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2, Date :	Semaine 3-4, Date :	Semaine 5-6, Date :	Semaine 7-8, Date :		
Lundi J1	-	12/09/16	26/09/16	10/10/16	24/10/16		
Mardi J2	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg		
Mercredi J3	-	0	0	0	0		
Jeudi J4	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg		
Vendredi J5	-	0	0	0	0		
Samedi J6	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg		
Dimanche J7	-	0	0	0	0		




Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2, Date :	Semaine 3-4, Date :	Semaine 5-6, Date :	Semaine 7-8, Date :
Lundi J8	100 mg	12/09/16	26/09/16	10/10/16	24/10/16
Mardi J9	-	0	0	0	0
Mercredi J10	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
Jeudi J11	-	0	0	0	0
Vendredi J12	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
Samedi J13	-	0	0	0	0
Dimanche J14	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg

Doses disponibles	Commentaires pour les patients et/ou les aidants (effets indésirables, autres traitements ou information importante)	
100 mg =  200 mg =  300 mg = 	Effet indésirable : petite réaction cutanée Médecin contacté traitement non interrompu Réalisé avec une protection solaire plus importante	Bien toléré après 8 semaines, nouvelle prescription avec dose augmentée (100 mg/jour) ==> Nouvelle page du tableau de suivi journalier

EXEMPLE D'AUGMENTATION DE DOSE POUR UN ENFANT DONT LA SC EST  
COMPRISE ENTRE 0,9M<sup>2</sup> ET < 1,2M<sup>2</sup> (SCHÉMA « 7 JOURS » : J1=J8)




Espace réservé au prescripteur		Tableau de suivi journalier pour le patient				
Poids : <u>35 kg</u> Taille : <u>125 cm</u> SC : <u>1,1</u> m <sup>2</sup> Date de prescription : <u>12/09/16</u> <input type="checkbox"/> Dose initiale <input checked="" type="checkbox"/> Augmentation de dose <input type="checkbox"/> Réduction de dose (voir les recommandations posologiques)		Nom du patient : _____ Date de naissance : _____ Si votre enfant oublie de prendre Caprelsa et que vous vous en apercevez : - 12 heures ou plus avant la dose suivante: prendre le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. - Moins de 12 heures avant la dose suivante: ne pas prendre ("sauter") la dose oubliée. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. NE PAS prendre une double dose (deux doses à la fois) pour compenser un oubli de dose.				
Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2, Date :	Semaine 3-4, Date :	Semaine 5-6, Date :	Semaine 7-8, Date :	
Lundi J1	100 mg	12/09/16 1 x 100 mg	26/09/16 1 x 100 mg	10/10/16 1 x 100 mg	24/10/16	
Mardi J2	200 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg		
Mercredi J3	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg		
Jeudi J4	200 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg		
Vendredi J5	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	Interrompu		
Samedi J6	200 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	Interrompu		
Dimanche J7	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	Interrompu		

Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2, Date :	Semaine 3-4, Date :	Semaine 5-6, Date :	Semaine 7-8, Date :
Lundi J8	100 mg	12/09/16 1 x 100 mg	26/09/16 1 x 100 mg	10/10/16 Interrompu	24/10/16
Mardi J9	200 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	Interrompu	
Mercredi J10	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	Interrompu	
Jeudi J11	200 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	Interrompu	
Vendredi J12	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	Interrompu	
Samedi J13	200 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	Repis à dose réduite	
Dimanche J14	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg		

Doses disponibles	Commentaires pour les patients et/ou les soignants (effets indésirables, autres traitements ou informations importantes)		
100 mg =  200 mg =  300 mg = 	Dose augmentée après 2 semaines à 100 mg pour myofasciopathie (faiblesse) vendredi (Coem 1) : diarrhée (1 épisode) Pas de changement	Amygdales : anopécilline Jeudi (Coem 4) : Petite réaction cutanée Médecin contacté Surveillance et pas d'exposition au soleil	Jeudi (Coem 5) : aggravation de la réaction cutanée Traitement interrompu Vendredi (Coem 6) : normalisation de la réaction cutanée Nouvelle prescription à dose réduite : voir nouvelle page du tableau de suivi

Espace réservé au prescripteur		Tableau de suivi journalier pour le patient				
Poids : _____ Taille : _____ SC : <u>1,68</u> m <sup>2</sup> Date de prescription : <u>12/09/16</u> <input type="checkbox"/> Dose initiale <input checked="" type="checkbox"/> Augmentation de dose <input type="checkbox"/> Réduction de dose (voir les recommandations posologiques)		Nom du patient : _____ Date de naissance : _____ Si votre enfant oublie de prendre Caprelsa et que vous vous en apercevez : - 12 heures ou plus avant la dose suivante: prendre le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. - Moins de 12 heures avant la dose suivante: ne pas prendre ("sauter") la dose oubliée. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. NE PAS prendre une double dose (deux doses à la fois) pour compenser un oubli de dose.				
Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2, Date :	Semaine 3-4, Date :	Semaine 5-6, Date :	Semaine 7-8, Date :	
Lundi J1	300 mg	<u>12/09/16</u> 1 x 300 mg	<u>26/09/16</u> 1 x 300 mg	<u>10/10/16</u>	<u>24/10/16</u>	
Mardi J2	300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg			
Mercredi J3	300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg			
Jeudi J4	300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg			
Vendredi J5	300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg			
Samedi J6	300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg			
Dimanche J7	300 mg	1 x 300 mg	<i>etc.</i>			




Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2, Date :	Semaine 3-4, Date :	Semaine 5-6, Date :	Semaine 7-8, Date :
Lundi J8	300 mg	<u>12/09/16</u> 1 x 300 mg	<u>26/09/16</u>	<u>10/10/16</u>	<u>24/10/16</u>
Mardi J9	300 mg	1 x 300 mg			
Mercredi J10	300 mg	1 x 300 mg			
Jeudi J11	300 mg	1 x 300 mg			
Vendredi J12	300 mg	1 x 300 mg			
Samedi J13	300 mg	1 x 300 mg			
Dimanche J14	300 mg	1 x 300 mg			

Doses disponibles	Commentaires pour les patients et/ou les soignants (effets indésirables, autres traitements ou informations importantes)	
100 mg =  200 mg =  300 mg = 	Dose augmentée après 8 sem à 200 mg/jour	






Espace réservé au prescripteur		Tableau de suivi journalier pour le patient					
Poids : _____ Taille : _____ SC : _____ m <sup>2</sup> Date de prescription : _____ <input type="checkbox"/> Dose initiale <input type="checkbox"/> Augmentation de dose <input type="checkbox"/> Réduction de dose (voir les recommandations posologiques) NE PAS prendre une double dose (deux doses à la fois) pour compenser un oubli de dose.		Nom du patient : _____ Date de naissance : _____ Si votre enfant oublie de prendre Caprelsa et que vous vous en apercevez: - 12 heures ou plus avant la dose suivante : prendre le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. - Moins de 12 heures avant la dose suivante: ne pas prendre ("sauter") la dose oubliée. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale.					
Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :		
Lundi J1							
Mardi J2							
Mercredi J3							
Jeudi J4							
Vendredi J5							
Samedi J6							
Dimanche J7							

Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :
Lundi J8					
Mardi J9					
Mercredi J10					
Jeudi J11					
Vendredi J12					
Samedi J13					
Dimanche J14					

Doses disponibles	Commentaires pour les patients et/ou les aidants (effets indésirables, autres traitements ou information importante)	
100 mg = 		
200 mg = 		
300 mg = 		




Espace réservé au prescripteur		Tableau de suivi journalier pour le patient					
Poids : _____ Taille : _____ SC : _____ m <sup>2</sup> Date de prescription : _____ <input type="checkbox"/> Dose initiale <input type="checkbox"/> Augmentation de dose <input type="checkbox"/> Réduction de dose (voir les recommandations posologiques) NE PAS prendre une double dose (deux doses à la fois) pour compenser un oubli de dose.		Nom du patient : _____ Date de naissance : _____ Si votre enfant oublie de prendre Caprelsa et que vous vous en apercevez: - 12 heures ou plus avant la dose suivante : prendre le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. - Moins de 12 heures avant la dose suivante: ne pas prendre ("sauter") la dose oubliée. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale.					
Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :		
Lundi J1							
Mardi J2							
Mercredi J3							
Jeudi J4							
Vendredi J5							
Samedi J6							
Dimanche J7							

Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :
Lundi J8					
Mardi J9					
Mercredi J10					
Jeudi J11					
Vendredi J12					
Samedi J13					
Dimanche J14					

Doses disponibles	Commentaires pour les patients et/ou les aidants (effets indésirables, autres traitements ou information importante)	
100 mg = 		
200 mg = 		
300 mg = 		



Espace réservé au prescripteur		Tableau de suivi journalier pour le patient					
Poids : _____ Taille : _____ SC : _____ m <sup>2</sup> Date de prescription : _____ <input type="checkbox"/> Dose initiale <input type="checkbox"/> Augmentation de dose <input type="checkbox"/> Réduction de dose (voir les recommandations posologiques) NE PAS prendre une double dose (deux doses à la fois) pour compenser un oubli de dose.		Nom du patient : _____ Date de naissance : _____ Si votre enfant oublie de prendre Caprelsa et que vous vous en apercevez: - 12 heures ou plus avant la dose suivante : prendre le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. - Moins de 12 heures avant la dose suivante: ne pas prendre ("sauter") la dose oubliée. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale.					
Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :		
Lundi J1							
Mardi J2							
Mercredi J3							
Jeudi J4							
Vendredi J5							
Samedi J6							
Dimanche J7							

Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :
Lundi J8					
Mardi J9					
Mercredi J10					
Jeudi J11					
Vendredi J12					
Samedi J13					
Dimanche J14					

Doses disponibles	Commentaires pour les patients et/ou les aidants (effets indésirables, autres traitements ou information importante)	
100 mg = 		
200 mg = 		
300 mg = 		

Espace réservé au prescripteur		Tableau de suivi journalier pour le patient					
Poids : _____ Taille : _____ SC : _____ m <sup>2</sup> Date de prescription : _____ <input type="checkbox"/> Dose initiale <input type="checkbox"/> Augmentation de dose <input type="checkbox"/> Réduction de dose (voir les recommandations posologiques) NE PAS prendre une double dose (deux doses à la fois) pour compenser un oubli de dose.		Nom du patient : _____ Date de naissance : _____ Si votre enfant oublie de prendre Caprelsa et que vous vous en apercevez: - 12 heures ou plus avant la dose suivante : prendre le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale. - Moins de 12 heures avant la dose suivante: ne pas prendre ("sauter") la dose oubliée. Prendre ensuite la dose suivante à l'heure normale.					
Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :		
Lundi J1							
Mardi J2							
Mercredi J3							
Jeudi J4							
Vendredi J5							
Samedi J6							
Dimanche J7							

Jour de la semaine	Dose prescrite	Semaine 1-2 Date :	Semaine 3-4 Date :	Semaine 5-6 Date :	Semaine 7-8 Date :
Lundi J8					
Mardi J9					
Mercredi J10					
Jeudi J11					
Vendredi J12					
Samedi J13					
Dimanche J14					

Doses disponibles	Commentaires pour les patients et/ou les aidants (effets indésirables, autres traitements ou information importante)	
100 mg = 		
200 mg = 		
300 mg = 