

# MES CONTACTS

## Médecin prescripteur

Nom :

Prénom :

Tél. :

## Infirmier(e)

Nom :

Prénom :

Tél. :

## Autres

TEGSEDI™ présente un risque de thrombocytopénie, de glomérulonéphrite et un risque potentiel de toxicité oculaire dû à une carence en vitamine A.

Chez les patients traités par TEGSEDI™, un contrôle des plaquettes est nécessaire au moins toutes les 2 semaines (voir RCP) et un contrôle du ratio protéines/créatinine urinaire (RPCU) et du débit de filtration glomérulaire (DFGe) sont nécessaires au moins tous les trois mois (voir RCP).

Le taux de plaquettes, le RPCU et le DFGe doivent être contrôlés pendant 8 semaines après l'arrêt du traitement.



**Le traitement par TEGSEDI™ doit être interrompu définitivement si : <sup>(2)</sup>**

- Le taux de plaquettes chute en dessous de  $25 \times 10^9/L$  : un traitement par corticostéroïdes est alors recommandé.
- Une glomérulonéphrite est confirmée : l'initiation précoce d'un traitement immunosuppresseur doit être envisagée.

# CARTE D'ALERTE PATIENT

**GARDEZ CETTE CARTE SUR VOUS PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VOTRE TRAITEMENT PAR TEGSEDI™ ET JUSQU'À 8 SEMAINES APRÈS L' ARRÊT DU TRAITEMENT. MONTREZ-LA À TOUS LES PROFESSIONNELLS DE SANTÉ QUI POURRAIENT INTERVENIR DANS VOTRE PRISE EN CHARGE ET EN CAS D'HOSPITALISATION.**

Ce patient est traité(e) par TEGSEDI™ dans le traitement de l'amylose à transthyrétine héréditaire avec polyneuropathies de stade 1 ou 2



Carte destinée au patient, diffusée sous l'autorité de l'ANSM

Tegsedi® est une marque déposée d'Akcea Therapeutics, Inc. Découverte et développée par Ionis Pharmaceuticals et distribuée dans le cadre d'un accord avec Akcea Therapeutics.

**TEGSEDI™ peut provoquer des effets indésirables graves ou pouvant menacer le pronostic vital.**

**Appelez votre médecin ou allez aux urgences si l'un des signes suivants apparaît :**

## Les signes et symptômes majeurs d'une thrombocytopénie ou glomérulonéphrite peuvent inclure :

- Des ecchymoses inexplicables ou des petites taches rouges sur la peau, souvent dans les membres inférieurs
- Des saignements dus à de petites coupures qui ne s'arrêtent pas ou qui suintent
- Des saignements des gencives ou du nez
- La présence de sang dans les urines ou les selles
- Un saignement dans le blanc des yeux
- Une raideur dans la nuque ou des maux de tête intenses et inhabituels

- La présence de sang dans les urines ou urines de couleur brune
- Des urines mousseuses (protéinurie)
- Une diminution du volume des urines

**Appelez également votre médecin si l'un des signes suivants apparaît :**

## Les signes et symptômes d'une carence en vitamine A peuvent inclure :

- Une sécheresse des yeux
- Des troubles de la vision
- Une diminution de la vision de nuit
- Une vision floue ou trouble
- Un gonflement des yeux



**Pensez à réaliser les contrôles sanguins et urinaires prescrits par votre médecin et gardez la liste de tous les autres traitements que vous utilisez actuellement lors de toute consultation chez le médecin.**

**Gardez cette carte avec vous en permanence pendant toute la durée du traitement par TEGSEDI™ et jusqu'à 8 semaines après l'arrêt du traitement.**

[Vous pouvez également déclarer les effets indésirables sur le portail www.signalementsante.gouv.fr](http://www.signalementsante.gouv.fr)