



## INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF DE DÉMONSTRATION

Veuillez lire ce document pour savoir comment utiliser le dispositif de démonstration et pour en savoir plus au sujet de BAQSIMI®.

### INDICATION

BAQSIMI® est indiqué dans le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 4 ans et plus ayant un diabète.

Pour plus d'informations, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) de BAQSIMI® disponible sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

Document diffusé sous l'autorité de l'ANSM.

## DISPOSITIF DE DÉMONSTRATION

### Informations importantes :

- Ce dispositif est conçu pour vous aider à former les patients et/ou les soignants à l'utilisation correcte de BAQSIMI® (voir les pages suivantes pour les informations d'administration du médicament).
- Veuillez noter les différences principales suivantes entre le dispositif de démonstration et le véritable médicament. Le dispositif de démonstration :
  - **Ne contient pas de médicament.**
  - **Est utilisé pour la démonstration uniquement.** NE PAS insérer l'embout dans la narine par mesure d'hygiène.
  - Peut être réinitialisé/réutilisé pour faire plusieurs démonstrations.

### Réenclenchement du dispositif de démonstration



**TENIR** la base de l'embout avec vos doigts. Tournez le corps du dispositif de démonstration jusqu'à ce que le piston se réenclenche et que la ligne verte soit à nouveau visible.

- ⚠ Contrairement au dispositif de démonstration, **chaque récipient unidosé de BAQSIMI® ne peut être utilisé qu'une seule fois.**
- ⚠ **Le dispositif de démonstration et BAQSIMI® doivent être conservés séparément** pour ne pas risquer de les confondre lors du traitement d'une hypoglycémie sévère.

## QU'EST-CE QUE BAQSIMI® ?

**BAQSIMI® est une forme de glucagon administré par pulvérisation nasale.**

### Quand utiliser BAQSIMI® ?

- **BAQSIMI® est utilisé lorsqu'une personne se trouve dans une situation d'urgence due à une hypoglycémie sévère (taux très bas de sucre dans le sang), où elle est incapable de manger ou de boire et où elle a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre.**
- Il est important que les personnes autour du patient (famille, amis, collègues, enseignants...) sachent reconnaître les signes d'une hypoglycémie sévère, afin qu'elles soient préparées et que le patient puisse compter sur leur aide.

### Les signes possibles d'une urgence liée à une hypoglycémie incluent :

- Sensations vertigineuses
- Inattention ou confusion
- Convulsion ou perte de connaissance
- Fluctuations d'humeur
- Manque de coordination
- Tremblements ou sueurs

Veuillez consulter les pages suivantes pour les informations d'administration du médicament.



## Les personnes ayant un diabète auxquelles BAQSIMI® a été prescrit doivent :

- L'avoir à portée de main en toutes circonstances
- Montrer à leur entourage (famille, amis, collègues, enseignants...) quand et comment l'utiliser pour qu'il sache quoi faire en cas de survenue d'une hypoglycémie sévère
- Indiquer à leur entourage où elles conservent BAQSIMI®

Pour regarder une vidéo expliquant comment utiliser BAQSIMI®, veuillez consulter le site internet [www.BAQSIMI.eu](http://www.BAQSIMI.eu) ou [www.lilly.fr/fr/medicaments/liste-medicaments/baqsimi-lilly.aspx](http://www.lilly.fr/fr/medicaments/liste-medicaments/baqsimi-lilly.aspx)



BAQSIMI® est une marque déposée d'Elis Lilly and Company.

PP-GN-FR-0004 - Juin 2020 © Lilly. Tous droits de reproduction réservés.

## ADMINISTRATION DE BAQSIMI®


### Lire le manuel d'utilisation de BAQSIMI® avant de l'utiliser.

- Indiquez à votre famille et à vos amis l'endroit où vous conservez BAQSIMI® et expliquez-leur comment l'utiliser. **Ils doivent savoir comment l'utiliser avant que vous en ayez besoin.**
- Ne retirez pas** le film plastique et n'ouvrez pas le tube avant d'être prêt à l'utilisation. Si le tube a été ouvert, le médicament peut avoir été exposé à l'humidité et pourrait ne pas agir comme prévu.
- BAQSIMI® contient 1 seule dose de glucagon : n'appuyez pas** sur le piston avant d'être prêt à administrer la dose. Sinon, la dose unique du récipient sera perdue.

### Préparation de la dose



Retirez le film plastique en tirant sur la bandelette rouge.



Ouvrez le couvercle et retirez le récipient unidose du tube.

**Attention : N'appuyez pas sur le piston avant insertion dans la narine.** Sinon, la dose unique du récipient unidose sera perdue.

### Administration de la dose :



- TENEZ** le récipient unidose comme montré sur l'image. **N'appuyez pas sur le piston avant l'insertion dans la narine.**



- INSEREZ** l'embout dans l'une des narines.



- APPUYEZ** sur le piston entièrement **jusqu'à ce que la ligne verte ne soit plus visible.**

Pour regarder une vidéo expliquant comment utiliser BAQSIMI®, veuillez consulter le site internet [www.BAQSIMI.eu](http://www.BAQSIMI.eu) ou [www.lilly.fr/fr/medicaments/liste-medicaments/baqsimi-lilly.aspx](http://www.lilly.fr/fr/medicaments/liste-medicaments/baqsimi-lilly.aspx)

### Après administration de la dose

- Si la personne est inconsciente :
  - Tournez-la sur le côté après avoir administré BAQSIMI®.
  - Contactez immédiatement une assistance médicale.**
- Dès que la personne a repris connaissance et est à nouveau capable d'avaler, encouragez-la à prendre une collation très sucrée (comme du sucre, du jus de fruit, des biscuits) puis du pain, pour éviter qu'une hypoglycémie ne revienne.
- Jetez le récipient et le tube usagés conformément à la réglementation locale en vigueur.**



Conservez le tube scellé jusqu'à l'emploi.

### LES MESSAGES IMPORTANTS À TRANSMETTRE AUX PATIENTS

- Expliquez** à votre entourage quand et comment utiliser BAQSIMI®.
- Dites-lui** où vous le conservez.
- Ne retirez jamais** le film plastique ni BAQSIMI® du tube jaune à l'avance.
- BAQSIMI® ne permet d'administrer qu'**une seule dose** : il ne faut pas appuyer sur le piston avant que l'embout ne soit dans la narine.
- Il faut toujours rechercher une aide médicale après avoir administré BAQSIMI® : **appelez le 15 ou le 112.**

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)