

## UVESTEROL VITAMINE ADEC

Administration chez le nouveau-né prématuré après arrêt de l'alimentation par sonde et à l'issue de la période d'apprentissage de l'oralité (jusqu'à l'âge du terme théorique de 35-36 semaines)

### PROTOCOLE D'ADMINISTRATION n°1

Préparer le flacon et la seringue pour administration orale



Utiliser le produit à température ambiante

- Prélever à l'aide de la seringue pour administration orale la dose à administrer et la **diluer dans 2 à 3 ml de lait dans une tétine 2<sup>ème</sup> âge** (position de la « fente » pour débit lent)
- Prendre le nouveau-né et l'installer en **position semi-assise au creux du bras**, avec la **tête en légère flexion, reposée sur le bras**)



- Laisser le nouveau-né téter doucement la tétine tout en surveillant ses réactions, lui retirer la tétine une fois vide

*Chez le nouveau-né ayant atteint l'âge du terme théorique (âge gestationnel minimum de 35 semaines et un poids de 1,5kg minimum), suivre le protocole d'administration N°2 (voir ci-après)*

## UVESTEROL VITAMINE ADEC

Administration chez le nourrisson né à terme et chez le nouveau-né prématuré ayant atteint l'âge du terme théorique (âge gestationnel minimum de 35 semaines et un poids de 1,5kg minimum)

### PROTOCOLE D'ADMINISTRATION n°2

Ne pas administrer à un nouveau-né âgé de moins de 24heures révolues.

En cas de reflux gastro-oesophagien, le produit ne doit pas être administré pur, mais dilué dans un peu d'eau ou de lait.

Il peut ainsi être administré dans une tétine ou un biberon de faible volume.

- Prélever à l'aide de la seringue pour administration orale la dose à administrer.



- Prendre le nourrisson et l'installer au creux du bras **en position semi-assise , avec la tête en légère flexion, reposée sur le bras.** (voir figure 1)
- Introduire avec précaution la seringue pour administration orale dans la bouche du nourrisson en prenant soin de la placer sous la langue pour que le nourrisson « goûte » le produit.

Deux modes d'administration sont préconisés en fonction de l'attitude du nourrisson :

- **Si le nourrisson tète la seringue, appuyer très lentement sur le piston de la seringue afin d'accompagner naturellement l'aspiration du produit par le nourrisson (voir figure 2).**
- **Si le nourrisson ne tète pas la seringue, introduire la seringue avec précaution en prenant soin de la placer contre l'intérieur de la joue. Appuyer très lentement, par fractions successives, sur le piston de la seringue afin que le produit s'écoule doucement dans la cavité buccale (voir figure 3).**

- Rincer la seringue pour administration orale après chaque utilisation.



Figure 1



Figure 2



Figure 3


**UVESTEROL D 1500UI/mL, solution buvable**  
**MODE D'ADMINISTRATION CHEZ LE NOURRISSON NÉ À TERME**

**Ne pas administrer à un nouveau-né âgé de moins de 24 heures révolues.**

**En cas de reflux gastro-oesophagien, le produit ne doit pas être administré pur, mais dilué dans un peu d'eau ou de lait.**

**Il peut ainsi être administré dans une tétine ou un biberon de faible volume.**

- Prélever à l'aide de la seringue pour administration orale la dose à administrer.



- Prendre le nourrisson et l'installer au creux du bras **en position semi-assise , avec la tête en légère flexion, reposée sur le bras.** (voir figure 1)
- Introduire avec précaution la seringue pour administration orale dans la bouche du nourrisson en prenant soin de la placer sous la langue pour que le nourrisson « goûte » le produit.

Deux modes d'administration sont préconisés en fonction de l'attitude du nourrisson :

- **Si le nourrisson tète la seringue, appuyer très lentement sur le piston de la seringue afin d'accompagner naturellement l'aspiration du produit par le nourrisson (voir figure 2).**
  - **Si le nourrisson ne tète pas la seringue, introduire la seringue avec précaution en prenant soin de la placer contre l'intérieur de la joue. Appuyer très lentement, par fractions successives, sur le piston de la seringue pour administration orale afin que le produit s'écoule doucement dans la cavité buccale (voir figure 3).**
- Rincer la seringue pour administration orale après chaque utilisation.



Figure 1



Figure 2



Figure 3