

Risque de confusion entre comprimés de Previscan 20 mg et de Lisinopril EG 20 mg - Communiqué

08/03/2010



L’Afssaps attire l’attention sur le risque de confusion entre deux médicaments, Previscan 20 mg et Lisinopril EG 20 mg, dont la présentation comprimés présente de grandes ressemblances. L’Afssaps recommande aux patients traités avec ces deux médicaments, de les conserver dans leur plaquette de présentation de manière à pouvoir les identifier au moment de la prise et éviter ainsi toute confusion.

Le médicament anticoagulant Previscan 20 mg (fluindione) est commercialisé depuis novembre 2009, en comprimés quadrisécables en forme de trèfle, destinés à en faciliter le fractionnement pour obtenir quatre parts égales de comprimé, lorsque le traitement le nécessite.

L’Afssaps a été destinataire de plusieurs signalements faisant mention d’un risque d’erreur médicamenteuse lié à l’étroite ressemblance des nouveaux comprimés de Préviscan 20 mg avec ceux de la spécialité Lisinopril EG 20mg (médicament antihypertenseur). L’un des signalements, traités par le Guichet Erreurs Médicamenteuses de l’Afssaps, rapporte l’erreur d’une patiente de 76 ans qui a pris un demi comprimé de Lisinopril EG 20 mg à la place d’un demi comprimé de Previscan 20 mg.

En conséquence l’Afssaps recommande aux patients traités avec Préviscan 20 mg et Lisinopril EG 20 mg ou avec des médicaments dont la forme de comprimé présente de fortes ressemblances de les conserver dans leur plaquette de présentation, de manière à pouvoir les identifier au moment de la prise de médicament et éviter toute confusion.

L’Afssaps a par ailleurs demandé aux pharmaciens de ville d’informer les patients de ce changement de forme de comprimés, lors de la délivrance de Préviscan. Elle a également demandé aux pharmaciens hospitaliers de relayer l’information auprès des professionnels de santé de leur établissement de santé.

L’Agence a engagé avec le laboratoire Procter & Gamble Pharmaceuticals une réflexion pour améliorer rapidement l’identification des comprimés de Previscan.



PREVISCAN®



LISINOPRIL®

Saint-Denis, le 8 mars 2010

Attention aux confusions liées à la similitude de forme des comprimés
Risque de confusion avec la nouvelle forme quadrisécable de PREVISCAN 20 mg

Madame, Monsieur,

L'Afssaps souhaite attirer votre attention sur le risque de confusion lié à la **nouvelle forme de comprimé quadrisécable en forme de trèfle de Préviscan 20 mg (fluindione)** commercialisée depuis novembre 2009, avec d'autres médicaments ayant des comprimés de forme semblables.

La modification du comprimé est intervenue afin d'améliorer la sécabilité et d'assurer ainsi l'obtention de quarts de comprimé uniformes.

Le Guichet des Erreurs Médicamenteuses de l'Afssaps a été destinataire de plusieurs signalements faisant mention d'un risque d'erreur médicamenteuse lié à l'**étroite ressemblance** des nouveaux comprimés de **Préviscan 20 mg** avec ceux de la spécialité **Lisinopril EG 20mg** en milieu hospitalier et en ville.

Une erreur avérée survenue en ville a été rapportée chez une patiente de 76 ans ayant pris un demi comprimé de LISINOPRIL EG 20 mg à la place d'un demi comprimé de PREVISCAN 20 mg.

Ce risque de confusion peut survenir avec d'autres spécialités ayant une forme de comprimé similaire.

Il est recommandé :

- aux pharmaciens hospitaliers d'informer l'ensemble des professionnels de santé de leur établissement de santé de ce changement de forme des comprimés.
- aux pharmaciens d'officine d'informer les patients lors de la délivrance de ce changement de forme des comprimés de Préviscan 20 mg et de leur préconiser de :
 - conserver les médicaments dans leur blister de façon à pouvoir identifier les comprimés jusqu'au moment de l'administration.
 - lire attentivement l'étiquetage du médicament avant sa prise afin d'éviter tout automatisme lié à la forme du comprimé.

L'Agence a engagé avec le laboratoire Procter & Gamble Pharmaceuticals une réflexion pour améliorer rapidement l'identification des comprimés de Previscan.

De plus, nous vous demandons de bien vouloir signaler toute erreur ou risque d'erreur médicamenteuse lié à cette confusion, au Guichet Erreurs Médicamenteuses de l'Afssaps par fax au : 01.55.87.33.10 ou par mail à l'adresse : ereur.medicamenteuse@afssaps.sante.fr

Annexe : la photographie des nouveaux comprimés de Préviscan 20 mg (comprimés quadrisécable en forme de trèfle) et de LISINOPRIL EG 20 mg.

ATTENTION AUX CONFUSIONS LIEES A LA SIMILITUDE DE FORME DES COMPRIMES
Risque de confusion avec la nouvelle forme quadri sécable de PREVISCAN 20 mg

PREVISCAN®



LISINOPRIL®

