

COORDONNÉES DE MON ONCOLOGUE (m'ayant prescrit YERVOY®)

Nom de mon oncologue

Téléphone de mon oncologue

MES INFORMATIONS

Nom et numéro de téléphone

Contact en cas d'urgence
(nom et téléphone)

© 2020 Bristol Myers Squibb. Tous droits réservés. 731FR2000810 - NP - Septembre 2020

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de YERVOY®

D'autres informations destinées au patient sont disponibles sur la **base de données publique des médicaments** (www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) ou sur le site de l'**Agence européenne du médicament** (www.ema.europa.eu).

Vous pouvez également contacter le service d'information médicale de Bristol Myers Squibb :

Tél. : 01 58 83 84 96 - Fax : 01 58 83 66 98 - e-mail : infomed@bms.com

Informations IMPORTANTES pour les professionnels de santé

- Ce patient est traité par YERVOY® en monothérapie.
- Des effets indésirables d'origine immunologique peuvent survenir à tout moment au cours du traitement, ou plusieurs mois après son arrêt.
- Un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée de ces symptômes sont indispensables afin de réduire les complications menaçant le pronostic vital.
- Une consultation avec un oncologue ou un autre spécialiste peut faciliter la prise en charge des effets indésirables d'origine immunologique spécifiques à un organe.
- Les professionnels de santé doivent se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) de YERVOY®.



Le professionnel de santé ayant prescrit YERVOY® à son patient doit compléter la section "Coordonnées de mon oncologue" de cette Carte d'Alerte Patient.



Carte d'alerte Patient

Ce document est diffusé sous l'autorité de l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments (ANSM)

Gardez cette carte sur vous afin d'avoir toujours ces informations à disposition, pendant toute la durée de votre traitement et plusieurs mois après l'arrêt de celui-ci. Présentez-la à tous les professionnels de santé que vous serez amené à consulter (par exemple si votre médecin habituel est indisponible ou si vous voyagez).

Retrouvez les informations concernant votre traitement par ipilimumab sous format électronique sur le lien suivant :

[HTTP://PWA.LTD/YERVOY-PAT-FR](http://PWA.LTD/YERVOY-PAT-FR)



Version V9 (Septembre 2020)

Informations IMPORTANTES pour les patients

Veuillez conserver cette carte avec vous de façon permanente afin d'informer les professionnels de santé que vous recevez un traitement par YERVOY® (ipilimumab) en monothérapie

Contactez votre médecin sans tarder si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants ou tout autre symptôme

IMPORTANT



- Informez votre médecin de vos antécédents médicaux.
- Une prise en charge précoce des effets indésirables réduit la probabilité de suspendre ou d'arrêter définitivement votre traitement par YERVOY®.
- Ces signes et symptômes peuvent sembler bénins mais peuvent rapidement s'aggraver s'ils ne sont pas traités.
- N'ESSAYEZ PAS de traiter vous-même vos symptômes.
- Les signes et symptômes peuvent apparaître de manière retardée, de quelques semaines à quelques mois après la dernière perfusion.

Pour une information complète sur le produit, veuillez lire attentivement la notice de YERVOY®

EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

INTESTIN OU ESTOMAC

- diarrhée (selles liquides, molles ou souples), sang dans les selles ou assombrissement de la couleur des selles
- accélération du transit intestinal (nombre d'émissions de selles augmenté par rapport à d'habitude)
- douleur ou sensibilité au niveau de l'estomac ou de l'abdomen, nausées, vomissements



FOIE

- coloration jaune du blanc des yeux ou de la peau (jaunisse)
- douleur au niveau du côté droit de l'estomac
- urines foncées



PEAU

- éruption cutanée avec ou sans démangeaisons, peau sèche
- ampoules et/ou desquamation de la peau, plaies dans la bouche (aphtes)
- gonflement du visage ou des ganglions lymphatiques



YEUX

- rougeur des yeux
- douleur oculaire
- troubles de la vision ou vision trouble/floue



SYSTEME NERVEUX

- faiblesse musculaire
- engourdissement ou fourmillement des jambes, des bras ou du visage
- étourdissements, perte de conscience ou difficulté à se réveiller



GÉNÉRAL

- fièvre, maux de tête, fatigue
- saignement
- changements de comportement (par exemple, baisse de libido, irritabilité ou perte de mémoire)
- déshydratation, faible pression artérielle, choc

