

En cas d'urgence, veuillez informer :

Nom du médecin :

.....

Téléphone du médecin :

Carte de surveillance patient

**Lariam®
250 mg**
(méfloquine)

Cette carte vous informe de l'importance de certains effets indésirables possibles avec Lariam® qui doivent vous conduire à consulter un médecin.

Lisez également la notice incluse dans la boîte – elle vous donne une information complète concernant Lariam®.

Conservez cette carte sur vous durant votre traitement.

Présentez cette carte lors de chaque visite médicale.

Lariam® peut induire des troubles neuropsychiatriques qui peuvent avoir des conséquences graves chez certains patients :

- Comportement inhabituel ou changement inhabituel de l'humeur
- Cauchemars, rêves anormaux, insomnies
- Confusion mentale
- Troubles de l'attention
- Dépression
- Anxiété sévère ou attaque de panique
- Agitation, nervosité, agressivité (sentiment de colère nouveau ou aggravé)
- Idées suicidaires ou comportement de mise en danger de soi-même
- Sentiments de défiance envers autrui (paranoïa),
- Psychose (perte de contact avec la réalité)
- Vision ou bruit de choses qui n'existent pas (hallucinations)

Veillez consulter immédiatement un médecin si vous ressentez ces troubles et ne continuez pas le traitement avec Lariam® sans son accord.

Pour les autres effets indésirables avec Lariam® notamment les signes d'appel de certains effets indésirables potentiellement graves, veuillez vous référer à la notice incluse dans la boîte.

Je prends un traitement préventif du paludisme avec Lariam® (méfloquine).

Votre nom :

.....

.....

90001802/10 28053089



28053089

In case of emergency,
please notify :

Doctor's name :

.....

Doctor's phone :

Patient Monitoring Card

**Lariam®
250 mg**
(mefloquine)

This card informs you about the importance of certain possible side effects with Lariam®.

Also read the Patient Leaflet included in the box – this gives you the full information about Lariam®.

Keep this card with you at all times during treatment.

Present this card to every doctor you see.

Lariam® may cause neuropsychiatric disorders that may have serious consequences in certain patients:

- Unusual behavior or unusual change in mood
- Nightmares, abnormal dreams, insomnia
- Confusional state
- Disturbance in attention
- Depression
- Severe anxiety or panic attacks
- Agitation, nervousity, aggression (new or worsening feeling of anger)
- Suicidal ideation or self-endangering behavior
- Feeling of mistrust towards others (paranoia)
- Psychosis (losing touch with reality)
- Seeing or hearing things that are not there (hallucinations)

Please seek physician advice immediately if you experience any of these problems and do not continue Lariam® treatment without physician agreement.

For the other side effects with Lariam® including preceding signs of some potentially serious side effects, please refer to the Patient Leaflet included in the box.

I am taking malaria chemoprophylaxis with Lariam® (mefloquine).

Your name :

.....

.....

90001802/10 28053089