



Pour plus d'informations lisez attentivement la notice d'AUBAGIO® et contactez votre médecin si vous avez des questions ou si vous présentez un effet indésirable.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé [www.signalement-sante.gouv.fr](http://ansm.sante.fr). Pour plus d'information, consultez la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

_____  Nom du neurologue

_____  Nom du médecin traitant

_____ Nom du centre

_____ / _____ / _____ Date de 1^{ère} prescription d'AUBAGIO®

_____ Nom du patient

CARTE PATIENT

Version 5 – Février 2020
Diffusé sous l'Autorité de l'ANSM

Cette **CARTE PATIENT** contient des informations importantes que vous devez connaître concernant votre traitement par AUBAGIO®.



GÉNÉRALITÉS

Montrez cette carte à tout médecin ou professionnel de santé impliqué dans votre prise en charge (en particulier en cas d'urgence médicale).

1 comprimé/jour

14mg

AUBAGIO
(tériflunomide)

SANOFI GENZYME 



EFFETS INDÉSIRABLES IMPORTANTS

Ce médicament peut affecter votre fonction hépatique et certaines cellules sanguines importantes pour combattre les infections. Un examen sanguin ainsi qu'une vérification de votre tension artérielle doivent être réalisés avant de débiter le traitement, puis régulièrement au cours du traitement.

Veillez contacter immédiatement votre médecin si vous présentez un des effets indésirables suivants :

- ✓ Coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux, urines foncées, nausées ou vomissements et douleur abdominale. Vous pourriez présenter un problème hépatique.
- ✓ Fièvre élevée, tremblements, frissons, gonflement des ganglions, débit urinaire réduit ou douloureux, ou confusion. Vous pourriez avoir une infection.

INFORMATION À DESTINATION DES FEMMES : GROSSESSE ET ALLAITEMENT



- ✓ Ne débitez pas un traitement par AUBAGIO® si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être. Votre médecin pourra vous demander d'effectuer un test de grossesse pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte, avant de débiter le traitement.
- ✓ Vous devez utiliser un moyen de contraception efficace pendant et après le traitement par AUBAGIO®, jusqu'à ce que la quantité d'AUBAGIO® dans votre sang soit suffisamment basse (ce qui sera vérifié par votre médecin). Un rappel de prise de contraceptif oral peut être utilisé à l'aide d'une application sur smartphones / tablettes.
- ✓ Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, contactez immédiatement votre médecin.
- ✓ Si vous découvrez que vous êtes enceinte, votre médecin pourra envisager un traitement spécifique visant à éliminer rapidement et efficacement AUBAGIO® de votre organisme.
- ✓ Vous devez également informer votre médecin si vous allaitez ou prévoyez d'allaiter car AUBAGIO® passe dans le lait maternel : vous ne devez pas allaiter pendant le traitement.