

**COVID-19 : importation du médicament DIPRIVAN 10 mg/mL,
Emulsion for injection or infusion (ampoule de 20 mL)
Attention aux erreurs médicamenteuses**

A l'attention des pharmaciens hospitaliers

Madame, Monsieur,

En accord avec l'ANSM, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les laboratoires Aspen mettent à disposition à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité **Diprivan 10 mg/mL, emulsion for injection or infusion en ampoule de 20 mL** en provenance du Panama.

ATTENTION : la spécialité importée ne fait pas l'objet d'un contre étiquetage en français.

Pour prévenir un risque d'erreurs médicamenteuses, vous trouverez ci-dessous des informations sur cette spécialité

Nous vous demandons de les mettre à disposition IMPÉRATIVEMENT des professionnels de santé qui vont administrer le médicament aux patients



La spécialité importée se trouve **sous forme d'ampoule (20 mL)** et **non sous forme de seringue pré remplie (50 mL)** comme la spécialité Diprivan 10 mg/mL, commercialisée en France : **voir au dos les nouvelles modalités d'administration.**

| | Médicament français | Médicament importé du Panama |
|---|--|--|
| Dénomination commerciale | DIPRIVAN 10 mg/ml, émulsion injectable en seringue pré-remplie | DIPRIVAN 10 mg/ml (1%), emulsion for injection or infusion |
| DCI | Propofol | Propofol |
| Concentration | 10 mg/mL | 10 mg/mL |
| Volume du contenant | Seringue préremplie : 50 mL | Ampoule de 20 mL |
| Quantité totale de principe actif par contenant | 500 mg | 200 mg |

Nous vous informons que le laboratoire ASPEN assure la responsabilité des lots importés de ce médicament, notamment en ce qui concerne la pharmacovigilance et les réclamations éventuelles.

Contact avec le laboratoire : 0805638407 ou aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Modalités d'administration de l'ampoule de DIPRIVAN importée (20 mL) :

- Agiter l'ampoule avant l'utilisation.
- En cas d'utilisation du propofol en perfusion, celui-ci ne doit être mélangé qu'avec une solution de glucose isotonique à 5 %.
- DIPRIVAN ampoule **peut être perfusé non dilué** à partir des seringues en verre ou en plastique.
- Toute fraction d'ampoule restant après usage devra être jetée.

INSTRUCTION D'OUVERTURE

- A. Tenir fermement d'une main le corps de l'ampoule inclinée POINT BLEU VERS LE HAUT.
- B. Mettre le pouce de l'autre main au-dessus du point bleu. Casser le col.