

Vous prescrivez à votre patient l'auto-injecteur d'adrénaline Emerade®. Merci de vous assurer en tant que prescripteur, que vous êtes en mesure de répondre "oui" aux questions ou affirmations suivantes, relatives à la prescription, la formation de l'utilisateur et à la conservation d'Emerade®.

Nom du patient :

### PRESCRIPTION

Le patient pèse-t-il entre 15 kg et 30 kg ? Prescrire Emerade® 150 microgrammes.

Le patient pèse-t-il entre 30 kg et 60 kg ? Prescrire Emerade® 300 microgrammes.

Le patient pèse-t-il plus de 60 kg ? Prescrire Emerade® 300 microgrammes ou Emerade® 500 microgrammes en fonction du diagnostic clinique.

J'ai prescrit 2 auto-injecteurs Emerade® au patient.

Le patient a compris l'importance d'avoir en permanence avec lui 2 auto-injecteurs Emerade®, dans le cas où une seule injection ne suffirait pas à améliorer les symptômes lors d'une anaphylaxie.

### MODE D'EMPLOI

Le patient connaît les symptômes d'une anaphylaxie et je lui ai expliqué dans quelles situations Emerade® doit être utilisé.

J'ai expliqué au patient comment utiliser correctement l'auto-injecteur Emerade® à l'aide du mode d'emploi présenté au verso de ce document.

J'ai indiqué au patient de composer le 15 ou le 112 immédiatement après avoir utilisé Emerade®, et de demander l'intervention du SAMU en précisant « anaphylaxie » et ce, même si les symptômes semblent s'améliorer.

J'ai indiqué au patient que si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent 5 à 15 minutes après la première injection d'Emerade®, il devra procéder à l'administration d'une nouvelle dose, en utilisant un 2<sup>ème</sup> auto-injecteur Emerade®.

J'ai remis au patient un trainer Emerade® (stylo de démonstration sans adrénaline ni aiguille) afin de s'entraîner et de savoir agir lors d'une situation allergique critique.

J'ai demandé au patient de ne pas transporter ou stocker le trainer avec les auto-injecteurs Emerade®.

J'ai remis au patient la brochure d'information patient expliquant comment utiliser l'auto-injecteur Emerade® et réduire les risques d'erreur d'administration.

J'ai incité le patient à visionner la vidéo d'utilisation de l'auto-injecteur Emerade® diffusée sur le site internet [www.emerade-bausch.fr](http://www.emerade-bausch.fr).

### CONSERVATION

J'ai indiqué au patient de conserver les auto-injecteurs Emerade® à l'abri de la lumière, dans leur boîte, à une température ne dépassant pas 25°C et de ne pas les mettre au congélateur.

J'ai indiqué au patient d'examiner régulièrement la solution à travers la fenêtre de contrôle de l'auto-injecteur en soulevant l'étiquette afin de vérifier que la solution est limpide et incolore, et de remplacer les auto-injecteurs Emerade® si la solution est colorée ou contient un précipité (des particules solides).

J'ai indiqué au patient de vérifier régulièrement la date de péremption de ses auto-injecteurs Emerade® afin de les remplacer si nécessaire.

J'ai recommandé au patient d'enregistrer un rappel de la date de péremption de ses auto-injecteurs Emerade® dans son téléphone ou sur le site internet [www.emerade-bausch.fr](http://www.emerade-bausch.fr).

Signature du prescripteur :

Date:

## COMMENT UTILISER L'AUTO-INJECTEUR EMERADE® ?

Chaque auto-injecteur Emerade® est à usage **unique**. Vérifiez à travers la fenêtre de contrôle, sous l'étiquette, que la solution est limpide et incolore.



► **Retirez** la protection de l'aiguille.



► **Appliquez** Emerade® contre la face externe de la cuisse puis appuyez. On entend un bruit sec au moment de l'injection dans le muscle. Maintenez le stylo contre la cuisse pendant **5 secondes**.

Puis massez doucement la zone d'injection.

Ensuite, même si les symptômes semblent s'améliorer, **composez le 15 ou le 112**, demandez une ambulance, dites que vous faites une anaphylaxie et que vous avez reçu une injection intramusculaire d'adrénaline.

En attendant l'ambulance, allongez-vous avec les jambes légèrement surélevées ou bien asseyez-vous en cas de difficultés à respirer. Demandez à quelqu'un de rester à vos côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, dans le cas où vous vous sentiriez mal à nouveau.

Si **les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent** dans les **5 à 15 minutes** qui suivent la première injection, vous ou la personne vous accompagnant, devez procéder à **une seconde injection**, avec un autre stylo Emerade®.

**C'EST POURQUOI VOUS DEVEZ AVOIR EN PERMANENCE SUR VOUS 2 AUTO-INJECTEURS EMERADE®.**