



CRITÈRES D'INCLUSION À L'EXPÉRIMENTATION

Certaines formes d'épilepsie pharmacorésistantes

Critères d'inclusion / non-inclusion communs à toutes les indications ou situations cliniques retenues

Critères d'inclusion communs à toutes les indications ou situations cliniques retenues

Le traitement par cannabis médical peut être mis en place uniquement chez des patients :

- ◆ qui répondent aux critères d'inclusion spécifiques d'au moins une des 5 indications

ET

- ◆ qui sont dans une situation de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise tolérance (effets indésirables) des thérapeutiques médicamenteuses ou non, accessibles.

Critères de non-inclusion communs à toutes les indications ou situations cliniques retenues

Le traitement par cannabis médical ne peut pas être mis en place :

- ◆ En cas d'impossibilité du patient à donner son consentement libre et éclairé, en personne ou, le cas échéant, par son ou ses représentants légaux (titulaires de l'autorité parentale, curateur, tuteur...);
- ◆ En cas d'absence de compréhension des questionnaires ou d'impossibilité de suivi ;
- ◆ En cas de contre-indication au cannabis médical (cf Contre-indication du cannabis médical).

Critères d'inclusion spécifiques à l'indication certaines formes d'épilepsie pharmacorésistantes

Indication	Critères d'inclusion cumulatifs	
	Adulte (> 18 ans)	Enfants dès l'âge de 18 mois
Certaines formes d'épilepsie pharmacorésistantes	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Épilepsie sévère pharmaco-résistante ◆ Crises focales avec rupture du contact avec ou sans généralisation, ou crises généralisées tonico-cloniques ◆ ≥ 4 crises / mois en moyenne avec une absence d'intervalle libre de crises de plus de 21 jours ◆ Échec d'au moins 5 médicaments antiépileptiques pour l'épilepsie focale, d'au moins 4 pour l'épilepsie généralisée 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Enfants avec épilepsies pharmacorésistantes (syndromes épileptiques pharmacorésistants, encéphalopathies développementales et épileptiques pharmacorésistantes, et des épilepsies rares d'étiologies génétiques pharmacorésistantes) ◆ Tous types de crises ◆ Ayant testé 3 médicaments au préalable