

Erreurs de délivrance: confusion entre LAMICTAL® (lamotrigine)¹ et LAMISIL® (terbinafine)² à l'origine de réactions cutanées graves ou de crises convulsives³.

Information destinée aux pharmaciens officinaux

Cinq cas graves d'effets indésirables liés à la délivrance erronée de LAMICTAL® (Lamotrigine) ¹, à la place de LAMISIL® (terbinafine) ², ou inversement, ont été rapportés à l'Afssaps depuis juillet 2007. Un de ces cas a fait l'objet d'une publication ³.

Ces confusions ont eu des conséquences graves pour les patients qui ont développé soit des réactions cutanées graves, soit des crises convulsives.

L'Afssaps demande aux pharmaciens :

- **D'être très vigilants lors de la délivrance de LAMICTAL® (lamotrigine) ou de LAMISIL® (terbinafine);**
- **De vérifier auprès du médecin, en cas de doute, l'indication pour laquelle le médicament est prescrit.**

Informations complémentaires

Dans 4 cas, le médicament LAMICTAL® a été délivré à la place du LAMISIL®. Les patients concernés ont développé des réactions cutanées graves à type de syndrome de Stevens Johnson, de syndrome de Lyell ou encore d'autres réactions d'hypersensibilité.

En effet, ces manifestations sont des effets indésirables connus de la lamotrigine. Elles surviennent généralement lors des premières semaines de traitement. Leur survenue est favorisée, notamment, par des posologies initiales de lamotrigine élevées ou lorsque le schéma d'augmentation des doses n'est pas respecté.

Dans 1 cas récent, le médicament LAMISIL® a été délivré à la place du LAMICTAL®. Le patient, traité pour une épilepsie par lamotrigine depuis 2001, a présenté trois crises épileptiques durant la même nuit, huit jours après le début de la prise de LAMISIL®. Le patient n'avait jamais eu auparavant de crises aussi nombreuses (rythme habituel d'une crise nocturne par mois maximum).

¹ Indications du **Lamictal® 200 mg**, comprimés dispersibles ou à croquer :

Epilepsie

- Chez l'adulte et l'adolescent âgés de 13 ans et plus :
 - Traitement en monothérapie ou en association des épilepsies partielles et généralisées, incluant les crises tonico-cloniques,
 - Crises associées à un syndrome de Lennox-Gastaut. Lamictal est administré en association à un autre traitement mais peut être l'antiépileptique (AE) de première intention dans le syndrome de Lennox-Gastaut.
- Chez l'enfant et l'adolescent de 2 à 12 ans :
 - Traitement en association des épilepsies partielles et généralisées, incluant les crises tonico-cloniques et les crises associées à un syndrome de Lennox-Gastaut,
 - Traitement en monothérapie des absences typiques.

Troubles bipolaires

- Chez l'adulte (18 ans et plus) :

- Prévention des épisodes dépressifs chez les patients présentant un trouble bipolaire de type I et qui ont une prédominance d'épisodes dépressifs

² Indications du **Lamisil® 250 mg** comprimés sécables :

- Onychomycoses
- Dermatophyties cutanées (notamment dermatophytie de la peau glabre, kératodermie palmo-plantaires, intertrigo interdigito-plantaire) ;
- Candidoses cutanées lorsque ces 2 dernières infections ne peuvent être traitées localement du fait de l'étendue des lésions

³ Le Loarer F, Carré-Gislard D, Baricault S, Bravard P. Toxidermie sévère due à une erreur de délivrance médicamenteuse.

Ann Dermatol Venereol. 2009;136(4):364-5.