

**Spécialités antihistaminiques H1 de première génération à base de phénothiazines (prométhazine, alimémazine et oxomémazine), chlorphénamine, pimétixène, ainsi que le fenspiride, utilisées dans le traitement de la toux -
Contre-indication chez l'enfant de moins de 2 ans**

Liste des spécialités concernées

A compter du 15 mars 2011

Médicaments retirés du marché

BRONCALENE NOURRISSONS, sirop (Hepatoum)
HEXAPNEUMINE NOURRISSONS, sirop (Bouchara Recordati)

Médicaments désormais contre-indiqués chez les enfants de moins de 2 ans (SS = Sans Sucre)

CALMIXENE, sirop (Novartis Pharma SAS)
OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop (Biogaran)
OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Biogaran)
OXOMEMAZINE EG 0.33 mg/ ml, sirop (EG Labo)
OXOMEMAZINE EG 0.33 mg/ ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (EG Labo)
OXOMEMAZINE PHR LAB 0.33 mg / ml, sirop (PHR LAB)
OXOMEMAZINE PHR LAB 0.33 mg / ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (PHR LAB)
OXOMEMAZINE TEVA 0.33 mg/ml, sirop (Teva Santé)
OXOMEMAZINE TEVA 0.33 mg/ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Teva Santé)
OXOMEMAZINE WINTHROP 0.33 mg / ml, sirop (Sanofi-Aventis)
OXOMEMAZINE WINTHROP 0.33 mg / ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Sanofi-Aventis)
PNEUMOREL 0,2 %, sirop (Servier)
TOPLEXIL 0,33 mg/ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Sanofi-Aventis)
TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop (Sanofi-Aventis)

Médicaments désormais contre-indiqués chez les enfants de moins de 2 ans uniquement dans l'indication de la toux

THERALENE 4 %, solution buvable en gouttes (Erempharma)
THERALENE 0,05 %, sirop (Erempharma)