

Principales caractéristiques du zanamivir et de l'oseltamivir

	zanamivir (Relenza®)	oseltamivir (Tamiflu®)
Nom du fabricant	G.S.K.	ROCHE
Mode d'action	Inhibiteur de la neuraminidase	
Site d'action	Action locale (tractus respiratoire)	Systémique
Indications¹		
Traitement curatif	Adulte et enfant > 5 ans	Adulte et enfant > 1 an
Prophylaxie post exposition	Adulte et enfant > 5 ans	Adulte et enfant > 1 an
Prophylaxie ante exposition (dans des circonstances exceptionnelles)	Adulte	Adulte
Posologie		
Traitement curatif	2 inhalations (2 x 5 mg) x 2/jour pendant 5 jours	13 ans et plus : 75mg x 2/jour pendant 5 jours 1-12 ans ≤ 15 kg : 30 mg x 2/j 15-23 kg : 45 mg x 2/j 23-40 kg : 60 mg x 2/j > 40 kg : 75 mg x 2/j pendant 5 jours
Prophylaxie post exposition	2 inhalations (2 x 5 mg) x 1/jour pendant 10 jours	13 ans et plus : 75mg x 1/jour pendant 10 jours 1-12 ans ≤ 15 kg : 30 mg x 1/j 15-23 kg : 45 mg x 1/j 23-40 kg : 60 mg x 1/j > 40 kg : 75 mg x 1/j pendant 10 jours
Voie d'administration	Inhalation orale, à l'aide du système Diskhaler	Orale (gélule, suspension buvable)
Contre-indications	Hypersensibilité à l'un des composants de la spécialité	
Précautions	En cas de bronchospasme et/ou d'altération des fonctions respiratoires parfois brutales et/ou graves	Adaptation de la posologie en cas d'insuffisance rénale
Principaux effets indésirables rapportés après commercialisation	Réactions cutanées Réactions d'hypersensibilité Bronchospasmes, dyspnée, sensation d'oppression ou de constriction au niveau de la gorge Troubles neuropsychiatriques	Réactions cutanées Réactions d'hypersensibilité Troubles gastro-intestinaux Perturbation de la fonction hépatique Troubles neuropsychiatriques

¹ limite d'âge inférieure susceptible d'être modifiée avec posologie adaptée