

Utilisation de Tamiflu®/ Relenza® et déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (G6PD)

Oseltamivir	Utilisation possible après analyse des données disponibles (littérature et pharmacovigilance)
--------------------	---

Recommandations particulières à l'attention des professionnels de santé

La prise de ce médicament est possible.

Conduite à tenir à l'attention des patients déficitaires en G6PD

La prise de ce médicament est possible.

Informations complémentaires

A ce jour, il n'existe pas de risque hémolytique identifié chez les sujets déficitaires en G6PD pour l'oseltamivir.

Spécialités

- TAMIFLU® 12mg/mL, poudre pour suspension buvable
- TAMIFLU® 30mg, gélule
- TAMIFLU® 45mg, gélule
- TAMIFLU® 75mg, gélule

Zanamivir	Utilisation possible après analyse des données disponibles (littérature et pharmacovigilance)
------------------	---

Recommandations particulières à l'attention des professionnels de santé

La prise de ce médicament est possible.

Conduite à tenir à l'attention des patients déficitaires en G6PD

La prise de ce médicament est possible.

Informations complémentaires

A ce jour, il n'existe pas de risque hémolytique identifié chez les sujets déficitaires en G6PD pour le zanamivir.

Spécialités

- RELENZA® 5mg/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose