

Hémorragies du système nerveux central associées à un traitement AVK : facteurs de risque

Enquête menée avec les Services de Neurochirurgie français par l'Association des Centres Régionaux de Pharmacovigilance

Lors d'une étude précédente, également menée par le réseau français des Centres régionaux de Pharmacovigilance à la demande de l'Afssaps, les accidents hémorragiques accompagnant un traitement par anticoagulant se sont révélés être les premières causes d'hospitalisation pour effet indésirable médicamenteux dans les services de médecine des hôpitaux publics de notre pays (13% de ces hospitalisations, soit 0,41% des 3.137 entrées analysées).

Les hémorragies du système nerveux central sont les complications les plus graves du traitement anticoagulant. C'est pourquoi, le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance a réalisé la présente étude pour quantifier le nombre de patients atteints d'hémorragie cérébro-méningée ou médullaire associée à un traitement anticoagulant par antivitamine K et hospitalisés dans les services de neurochirurgie des hôpitaux publics métropolitains.

Sur des périodes de 15 jours, réparties du 19 septembre au 17 décembre 2000, les hospitalisations de 40 services de neurochirurgie ont toutes été répertoriées grâce à la collaboration des médecins, des infirmières et des secrétaires de ces services. Ainsi, environ 4700 admissions ont pu être enregistrées comportant plus de 800 hémorragies du système nerveux central (soit 17% des entrants).

Près de 8% de ces hémorragies concernaient des patients traités par antivitamine K.

Les experts n'ont pas jugé possible de reproduire l'étude en 2003 en raison de l'évolution de la prise en charge des accidents vasculaires hémorragiques et du développement de nouvelles techniques d'imagerie.