

Information patient sur le vaccin méningococcique A + C

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de vous faire vacciner.
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Vous devez suivre attentivement les conseils de votre médecin ou de votre infirmier/ère.
Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou à votre infirmier/ère.
Ce vaccin vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Ne pas utiliser le VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C si vous ou votre enfant:

- êtes allergique à tout composant de ce vaccin
 - présentez une maladie fébrile aiguë sévère (fièvre élevée), la vaccination devra alors être différée.
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte, si vous prévoyez une grossesse ou allaitez votre enfant..

Effets indésirables éventuels ?

Comme tous les vaccins, le VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C est susceptible de provoquer des effets indésirables.

De plus, nous souhaitons vous faire part des dernières données de tolérance puisque VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C est déjà commercialisé dans d'autres pays . C'est ainsi que sur une période de 17 années de commercialisation, environ 400 effets indésirables survenus chez 200 sujets vaccinés ont été rapportés pour un total de 390 millions de doses injectées (1 effet indésirable pour 963 000 doses). Des effets indésirables graves ont été très rarement rapportées (1 effet indésirable grave pour 5.4 millions de doses).

Réactions locales au site d'injection : des douleurs transitoires parfois associées à un gonflement ou une rougeur ont été rapportées

Réactions générales : fièvre, maux de tête, réactions de type allergique (urticaire, éruption érythémateuse), douleurs musculaires, douleurs des articulations et troubles gastro-intestinaux ont été rarement observées.

Dans de très rares cas des troubles neurologiques (sensations de picotements et de fourmillements, réactions méningées, et convulsions) ont été rapportés.

De façon exceptionnelle, des réactions allergiques sévères (réactions anaphylactiques) ont été rapportées (<0.01%).

Ce vaccin ne provoque pas de méningite A ou C (syndrome dû au méningocoque A ou C). Si votre enfant ou vous-même présentez une douleur au cou, un raidissement de la nuque, une aversion pour la lumière (photophobie), de la somnolence ou un sentiment de malaise, des tâches rouges ou violacées semblables à des hématomes, contactez immédiatement votre médecin pour en trouver la raison.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Comment conserver le VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver entre +2°C et +8°C (au réfrigérateur). Ne pas congeler