

**Afssaps**

**Centres d'Evaluation et d'Information sur  
la Pharmacodépendance (CEIP)**

**ASOS  
(Antalgiques Stupéfiants et ordonnances Sécurisées)**

**RESULTATS DE L'ENQUETE 2005  
et  
résumé des résultats des enquêtes ASOS 2001-2004**

Les modifications des règles de prescription des médicaments inscrits sur la liste des stupéfiants, intervenues en octobre 1999 (suppression du carnet à souche, mise en place des ordonnances sécurisées (OS)) avaient pour but de faciliter la prise en charge et le traitement de la douleur en France. Le réseau des Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance (CEIP) a réalisé, à la demande de l'Unité des Stupéfiants et Psychotropes de l'Afssaps, une première enquête en mai 2001, reconduite au printemps chaque année depuis auprès de pharmaciens d'officine. Les objectifs de ces enquêtes étaient de recueillir l'opinion de pharmaciens, décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants (AS), décrire les modalités d'utilisation des AS, évaluer le respect des règles de prescription et comparer les données recueillies (au cours des années et depuis la première enquête de 2001). Cette enquête transversale annuelle est réalisée par le réseau des Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance (CEIP); elle est coordonnée par le CEIP de BORDEAUX.

## **Méthode**

Cinq cent pharmacies ont été tirées au sort en France métropolitaine.

Outre un questionnaire destiné au pharmacien pour recueillir son opinion, une fiche spécifique devait être remplie pour chaque délivrance d'ordonnance comportant un AS au cours d'une semaine d'étude, du 13 au 18 juin 2005.

## **Résultats**

<b>opinion des pharmaciens</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
nb pharmacies ayant participé : n (%)	119 (23,2)	88 (17,2)	170 (34)	139 (27,8)	134 (26,8)
meilleure prise en charge douleur aujourd'hui : (%)	65,4	86,6	96,9	90,9	88,9
si oui, due à suppression carnet à souche (%)	28,9	46,3	50,3	36,7	

<b>délivrance d'AS</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
pas de délivrance dans la semaine (%)	21	12,5	22	22,5	22,4
nb sujets inclus	173	147	302	229	242
nb moy /semaine/pharmacie	1,46	1,67	1,77	1,64	1,81
âge moyen (médiane, extrêmes)	58,4 (64 ; 23-94)	64,5 (66 ; 27-96)	63,6 (65,5 ; 16-99)	64,7 (66 ; 20-96)	62,2 (60,5 ; 24-96)
sexe (%)	H 45,7 ; F 54,3	H 41 ; F 59	H 44,5 ; F 55,5	H 44,4 ; F 55,6	H 38,5 ; F 61,5
prescripteurs libéraux (%)	79,2	77,4	82,8	66,7	77,7
MG (%)	79	83,1	85,8	83,7	81,4
non-conformité (%)					
pas d'ordonnance sécurisée	6,7	3,5	4,7	3,6	3,3
posologie en chiffres	16,3	14	19,9	18,9	12,6
carré sécurité non rempli	33,7	27,8	25,8	25,9	17,6
espace dernière ligne/signature	45	42,7	47,6	38,1	40,6
spécialités les plus prescrites (%)	Skénan® 35,3 Durogésic® 33,2 Moscontin® 8 Sévrédol® 7	Skénan® 38 Durogésic® 33,1 Moscontin® 5,5 Sévrédol® 5,5	Durogésic® 35,9 Skénan® 34,2 Actiskénan® 16,2 Sévrédol® 4	Skénan® 31,8 Durogésic® 30,4 Actiskénan® 21,6 Sévrédol® 4,2	Skénan® 32,7 Durogésic® 30,6 Actiskénan® 17,8 morphine inj 5,0
nouveaux traitements (%)	9,6	19,2	25,2	18,7	21,3
douleur calmée (%)	86	89,3	78,5	84,2	84,5
ancienneté ttt ≥ 6 mois (%)	54,4	56,8	39,4	48,2	57,0
ordonnance suspecte	-	-	2	-	-
morphine comme ttt substitution (% du total sulfate morphine) (intervalle confiance 95%)	8 (10,0) [4,3-19,7%]	6 (8,5) [3,1-18%]	7 (5,6) [2,2-11,5%]	4 (4,0) [1,1-10%]	5 (3,9) [0,5-7,2%]

## **Indications** (nouvelle question introduite en 2004)

Lors de l'enquête 2005 les indications à l'emploi des AS, lorsqu'elles sont précisées, sont majoritairement cancérologiques (44%), rhumatologiques (24%), neurologiques (10%) et autres (22%) (contre respectivement 64%, 23%, 7% et 6% en 2004).

## **Commentaires**

L'enquête menée en 2005 montre des résultats globalement stables comparés aux résultats de l'enquête 2004. La presque totalité des pharmaciens interrogés (88,9%) a l'impression que la douleur est mieux prise en charge aujourd'hui.

Par rapport à 2004, le pourcentage de nouveaux traitements par AS est en augmentation ; la part des indications cancérologiques a fortement diminué en 2005.

Les variables étudiées sur la délivrance d'AS montre que :

- le nombre de malades traités par semaine et par pharmacie est en hausse, avec une prise en charge de la douleur (douleur calmée en pourcentage) stable par rapport à 2004.
- les patients bénéficiant d'une délivrance d'AS sont de sexe féminin dans 61,5% des cas.
- la conformité des ordonnances est meilleure : tout comme l'année passée, certains indicateurs sur la conformité des ordonnances montre une amélioration de la rédaction. Mais il faut souligner un pourcentage toujours très élevé d'un intervalle large entre la dernière ligne de prescription et la signature, qui représente un risque de falsification (rajout de médicament).

Le palmarès des spécialités les plus prescrites reste inchangé avec une large utilisation de formes de longue durée d'action, même si la morphine injectable se classe désormais en quatrième position en termes de prescription d'AS.

**Le réseau des CEIP et l'Afssaps remercient très chaleureusement tous les pharmaciens  
qui ont participé à cette enquête.**