

Nom du Cardiologue :

Nom du Patient :

Date de la consultation: □□ □□ □□

Centre :

ETUDE DE SUIVI PROSPECTIF BENFLUOREX : fiche d'inclusion

(à compléter pour tous les patients traités par benfluorex)

Est-ce que vous avez reçu le courrier d'information de l'Afssaps ? ☐ oui ☐ non

Est-ce que le patient a reçu le courrier d'information de l'Afssaps ? ☐ oui ☐ non

Caractéristiques du patient :

Date de Naissance : □□ □□ □□ Sexe : ☐ M ☐ F Poids : kg Taille : m BMI : kg/m²

Antécédents médicaux et facteurs de risque du patient :

	oui	non		oui	non		oui	non
Diabète			Hypertriglycéridémie			Insuffisance coronarienne		
--> Si diabète, ancienneté du diabète :			Tabac			Insuffisance cardiaque		
Hypercholestérolémie			Hypertension artérielle			Rhumatisme articulaire aigu		
Maladie de Parkinson			Dépression			Cardiopathie connue :		
Antécédents cardio vasculaires familiaux			Autres antécédents d'intérêts :			→ Si cardiopathie connue, préciser le type :		

Chirurgie cardiaque : ☐ oui ☐ non si oui → date : □□ □□ □□

☐ RVM ☐ RVA ☐ Plastie mitrale ☐ Plastie tricuspide ☐ Annuloplastie

Examen anatomopathologique des valves réalisé ce jour : ☐ oui ☐ non

Examen clinique :

Signe fonctionnel d'IVG, IVD : ☐ oui ☐ non

Classe actuelle dyspnée NYHA :

Signe physique d'IVG, IVD : ☐ oui ☐ non

Pression artérielle :

Fréquence cardiaque :

Auscultation cardiaque (si réalisable) :

	OUI	NON	Intensité (1 à 6/6)	Depuis combien d'années (si diag aujourd'hui)
Souffle systolique d'IM				
Souffle diastolique d'IA				
Souffle systolique d'IT				

Traitement antérieur du patient :

- Benfluorex (Mediator®, Benfluorex Mylan®, Benfluorex Qualimed®) : Dose quotidiennemg

Indication : ☐ Diabète ☐ Hypertriglycéridémie ☐ Surpoids ☐ Inconnue

Durée du traitement :mois Date arrêt du traitement : □□ □□ □□

- Autres traitements potentiellement inducteurs de valvulopathie/HTAP

	Nom	Durée exposition (mois)	Date d'arrêt du traitement	Posologie
Anorexigène/amphétamine : Pondéral®, Isomérider®, Tenuate Dospan®, Dinintel®, Fenproporex®, Incital®, Prefamone®, Moderatan®, Panorex®...				
Alcaloïdes de l'ergot : Ergotamine (Gynergène®) ; Dihydroergotamine (Diergospray®, Ikarant®, Seglor®, Tamik®) ; Dihydroergocryptine (Vasobral®) ; Bromocriptine (Bromo-Kin®, Parlodel®) ; Pergolide (Célanche®) ; Cabergoline (Dostinex®) ; Lisuride (Dopergine®, Arolac®)				
Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine : Citalopram (Seropram®) ; Escitalopram (Seroplex®), Fluoxetine (Prozac®), Fluvoxamine (Floxyfral®), Paroxetine (Deroxat®, Divarius®) ; Sertraline (Zoloft®)				
Autres traitements antérieurs d'intérêts :				

Traitement actuel du patient :

	OUI	NON		OUI	NON		OUI	NON		OUI	NON
Insuline			Statine			Betabloqueur			Clopidogrel		
Sulfamide hypo			Fibrate			Ca bloqueur			Anti HTA centraux		
Biguanide			Allopurinol			Sartan			Digoxine		
Glitazone			Maxepa			Diurétique			Autres traitements d'intérêts :		
Autres antidiabétiques			Omacor			Aldactone					
→ Si oui préciser le nom			IEC			Aspirine					