


ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d'un échantillon national tiré au sort de 1500 pharmacies d'officine (métropole et départements d'Outre-Mer) sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d'évaluer le respect des règles de prescription et de suivre l'évolution dans le temps de ces données.

RÉSULTATS 2019

En 2019, 174 pharmacies ont participé à l'enquête (taux de participation : 11,6 %) et 518 malades ont été inclus.



PRESCRIPTEURS


Les médecins libéraux représentaient 83,1 % des prescripteurs, les hospitaliers 16,7 %, les CSAPA 0,2 %. Dans 83,1 % des cas, le prescripteur était généraliste, dans 16,9 % des cas, un autre spécialiste (cancérologue : 5,6 %, rhumatologue : 1,6 %, chirurgien : 1,4 %, pneumologue : 1 %, autres : 6,6 %).

MÉDICAMENTS

Les médicaments les plus prescrits sont :

- par DCI : oxycodone (34%), morphine (32,3%) et fentanyl (32,2%).
- par spécialité : Durogésic® (19,4 %), Oxynorm(oro)® (17,7 %), Oxycontin® et Skenan® (16,1 %) et Actiskénan® (15,1 %). Il s'agissait d'un nouveau traitement dans 17,7% des cas, d'un traitement de plus d'un an dans 23,7 % des cas.

PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS PAR INDICATION



Conformité des ordonnances	%
ordonnance sécurisée	97,7
posologie en lettres	93,4
carré de sécurité rempli	93,4
espace étroit dernière ligne/signature	75,7


CARACTÉRISTIQUES DES MALADES

L'âge moyen était de 68,2 ans (médiane : 69 ; extrêmes : 19 -101 ans) ; 41,8 % avaient 75 ans ou plus.

Il y avait 63,2 % de femmes et 36,8 % d'hommes.

INDICATIONS

Dans 61,9 % des cas, il s'agissait d'une douleur chronique et dans 17,9 % des cas, d'une douleur aiguë (dans 1,9 % des cas, les deux).



DISCUSSION / CONCLUSION

Pour la première fois depuis le début de l'enquête, l'Oxycodone est le médicament le plus prescrit devant la Morphine puis le Fentanyl (en dehors de l'indication neurologie) : Le nombre de malades sous Oxycodone est en hausse de 5,7 %, majoritairement prescrite dans l'indication rhumatologie.

Cette augmentation est confirmée par l'augmentation de la consommation de ce médicament au niveau national. En parallèle, malgré le statut de stupéfiant de l'Oxycodone ce médicament est de plus en plus cité en France, dans des cas de détournement et d'obtention en dehors d'un cadre de douleurs chroniques signalés aux centres d'addictovigilance.

Les indications rhumatologiques et cancérologiques sont majoritaires (bien qu'en légère baisse en rhumatologie).

Les indications neurologiques sont en légère diminution, Les indications « Autres » sont toujours en augmentation, l'oxycodone étant la principale molécule prescrite.

Les prescriptions de fentanyl transmuqueux restent stables, Pour le fentanyl transdermique, les indications rhumatologiques rejoignent les indications cancérologiques, en 1ère position devant les indications neurologiques.