

ANSM

**Centres d'Evaluation et d'Information sur la
Pharmacodépendance**

(CEIP)

ASOS 12

(Antalgiques Stupéfiants et Ordonnances Sécurisées)

RESULTATS DE L'ENQUETE 2012

Et résumé des résultats des enquêtes ASOS 2010-2012

L'enquête ASOS

Les objectifs de l'enquête ASOS (Antalgiques Stupéfiants - Ordonnances Sécurisées) sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de prescription de ces antalgiques, d'évaluer le respect des règles de prescription et de suivre l'évolution dans le temps de ces données depuis 2001. Cette enquête transversale est menée chaque année pendant une semaine auprès de 1 500 pharmacies tirées au sort avec une stratification par département.

Réalisée par le réseau des Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance (CEIP), elle est coordonnée par le CEIP de Bordeaux.

Résultats

En 2012, 231 pharmacies (sur 1500 tirées au sort) ont participé à l'étude ASOS en France, soit un taux moyen de participation de 15,4% *versus* 17,1% l'année précédente ; 618 sujets ont été inclus. Le nombre moyen de malades était de 2,68 par pharmacie et par semaine.

L'âge moyen des patients était de 66,7 ans ; plus d'un tiers avait 75 ans ou plus (40% vs 34,2% en 2011). Ces patients étaient majoritairement des femmes (57,6%).

Les médecins libéraux représentaient 82,4% des prescripteurs, les hospitaliers 17,6%. Le prescripteur était un médecin généraliste dans 82,8% des cas et un spécialiste dans 17,2% des cas dont en cancérologie (34,7%), en rhumatologie (11,2%), en centre anti-douleur (10,2% vs 1,1% en 2011), en gériatrie et soins palliatifs (7,1%), en gastroentérologie (6,1%), en pneumologie (4,1%), et en néphrologie (2%).

Les antalgiques les plus prescrits étaient Durogésic® et génériques (34% vs 31,6% en 2011), Skénan® (17,5% vs 20,2% en 2011), Actiskénan® (14,1% vs 15,2% en 2011), Oxycontin® (13,7% vs 11,6% en 2011), Oxynorm®/Oxynormo® (11,3% vs 9% en 2011).

En regroupant par substance active toutes formes et voies d'administration confondues, le fentanyl restait comme en 2011 l'antalgique stupéfiant le plus prescrit (39,1% vs 39,4% en 2011 et 36,1% en 2010), la part de la morphine diminuait (34,3% vs 38,6% en 2011 et 44,3% en 2010) et celle de l'oxycodone augmentait (25% vs 20,6% en 2011 et 18,7% en 2010).

Il s'agissait d'un nouveau traitement dans 22,6% des cas, d'un traitement de plus d'un an dans 37,4% des cas.

Les indications rhumatologiques (36,6%) et cancérologiques (33,4%) restaient majoritaires.

Les antalgiques stupéfiants étaient le plus fréquemment prescrits pour des douleurs chroniques (62,1%), moins souvent pour des épisodes douloureux aigus (20,3%), (dans 3% des cas, les 2 « cases » étaient cochées).

D'après le malade ou son entourage, la douleur était calmée dans 73% des cas (vs 73,9% en 2011 et 82,2% en 2010).

Enfin, les traitements de substitution de la dépendance aux opiacés représentaient 0,4% (hors AMM).

La conformité aux règles de prescription était stable avec l'emploi quasi systématique d'ordonnances sécurisées (93,5% des ordonnances), la rédaction de la posologie en chiffres (81,7%), le remplissage du carré de sécurité (85,1%) et un espace étroit entre la dernière ligne de prescription et la signature du praticien (67%).

Le tableau présenté en fin de document résume l'ensemble des données recueillies depuis 2010.

Conclusion

L'analyse de ces résultats montre peu de changements par rapport aux enquêtes précédentes mais certaines données sont importantes à préciser :

- la morphine et le fentanyl restent en tête des antalgiques stupéfiants, suivi par l'oxycodone en progression de plus en plus nette ;
- dans cette enquête 2012, les indications rhumatologiques et cancérologiques restent majoritaires ;
- le fentanyl d'action rapide est prescrit dans des indications hors AMM (patients non cancéreux et/ou n'ayant pas de traitement de fond opiacé).

Le réseau des CEIP et l'ANSM remercient très chaleureusement tous les pharmaciens qui ont participé à cette enquête.

Comparaison des 3 dernières enquêtes ASOS, 2010-2012

délivrance d'antalgiques stupéfiants	2010	2011	2012
nombre de pharmacies participantes	246	256	231
pas de délivrance dans la semaine (%)	11	11,3	15,2
nombre de sujets inclus	623	642	618
nombre moyen / semaine / pharmacie	2,53	2,51	2,68
âge moyen (médiane ; extrêmes)	65 (65 ; 17-100)	65 (65 ; 6-98)	66,7 (67 ; 6-102)
sexe (%)	H 41,7 ; F 58,3	H 39,2 ; F 60,8	H 42,4 ; F 57,6
prescripteurs libéraux (%)	84,1	82,2	82,4
médecins généralistes (%)	84,4	84,2	82,8
non-conformité (%)			
ordonnance non sécurisée	5,2	6,2	6,5
posologie en chiffres	12	13,9	18,3
carré de sécurité non rempli	16,7	18,8	14,9
espace dernière ligne/signature	27,9	32,9	33
spécialités les plus prescrites (%)	Durogésic* et génériques : 32,5	Durogésic* et génériques : 34,5	Durogésic* et génériques : 34
	Skénan* : 20,5	Skénan* : 20,2	Skénan* : 17,5
	Actiskénan* : 19	Actiskénan* : 15,2	Actiskénan* : 14
	Oxycontin* : 11,4	Oxycontin* : 11,6	Oxycontin* : 13,7
nouveaux traitements (%)	22,5	21	22,6
douleur calmée (%)	82,2	73,9	73
ancienneté traitement > 6 mois (%)	44,9	45	50,6