

L'enquête **OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateurs d'Abus Possible)** contribue à l'évaluation du potentiel d'abus et de dépendance des médicaments grâce à la surveillance et au recueil des ordonnances suspectes identifiées par les pharmaciens d'officine. Un recueil de données est organisé 2 fois par an en mai et novembre (« périodes d'enquête ») : les pharmaciens sollicités par le réseau français des CEIP-Addictovigilance (Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers et Toulouse) enregistrent ces ordonnances suspectes de façon systématique à partir d'un questionnaire collectant les caractéristiques démographiques, les médicaments concernés et les critères de suspicion de l'ordonnance. Les ordonnances collectées en dehors de ces périodes d'enquête sont également enregistrées (notamment celles transmises par les ARS).


OSIAP identifiées en 2016

Au total, **1 326 ordonnances** falsifiées ont été collectées en 2016 (224 en mai-novembre et 1 102 hors-enquête). Ces ordonnances comptent **2 647 citations de médicaments** (632 en mai-novembre et 12 015 en dehors des périodes d'enquête), soit 309 substances et 430 spécialités différentes.


Médicaments cités en 2016

Le **zolpidem** reste la substance la plus fréquemment citée, avec 37,4% des citations. La **buprénorphine**, le **tramadol (seul ou en association)**, l'**alprazolam** et le **bromazépam** viennent ensuite. La part des citations de buprénorphine et de tropicamide est en forte augmentation par rapport à 2015 (82 citations en 2016 contre 9 en 2015) tandis que celle de la codéine associée au paracétamol a diminué (même si le nombre de citations a augmenté en 2016).

La part de citations du **clonazépam** dans les OSIAP, en forte diminution depuis 2012 (6,3% de citations), a encore été divisée par deux entre 2015 et 2016 (passant de 1,6% à 0,8%, soit 10 citations).



Nombre d'OSIAP recueillies par département en 2016



*Les spécialités contenant du tramadol (seul et en association au paracétamol) ont été regroupées

Caractéristiques des demandeurs

L'âge et le **genre** des demandeurs étaient signalés respectivement pour **51%** et pour **88%** des ordonnances collectées. Les demandeurs étaient le plus souvent des **hommes (47% contre 41% de femmes)**. L'âge moyen était de $42,1 \pm 14,7$ ans (minimum 3 – maximum 86).

Dans 16% des cas, le patient était connu dans l'officine recueillant l'ordonnance (donnée disponible seulement dans les périodes d'enquête).

Caractéristiques des ordonnances

Types d'ordonnance : Il était spécifié dans 71% des OSIAP. Les ordonnances étaient majoritairement **simples (44%)**, puis sécurisées (15%), bizones (12%) et hospitalières (4%).

Critères de suspicion : La plupart (58%) des OSIAP étaient **falsifiées** (c'est-à-dire fabriquées sur PC, photocopiées, scannées), ou étaient identifiées par un élément de **contexte suspect** (par exemple refus de montrer la carte vitale, 33%) ou **volées** (14%). La buprénorphine et le zolpidem était les 2 médicaments majoritairement identifiés dans ces ordonnances, suivis de l'alprazolam, diazepam et oxazepam.

Nous adressons nos vifs remerciements à l'ensemble des pharmaciens participants pour leur collaboration active dans le cadre de l'enquête OSIAP.