


# **REDUCTION DES OVERDOSES LIEES AUX TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIACÉS**

Audition de la Commission des Stupéfiants et Psychotropes  
ANSM – 21 juin 2018


Pr Maurice Dematteis  
Professeur d'Addictologie et Pharmacologie  
Chef du Service de Pharmaco-Addictologie – CHU Grenoble Alpes  
CUNEA (Collège Universitaire National  
des Enseignants d'Addictologie)

# Les TSO en France et ailleurs : que dit l'histoire ?



Carrieri et al. Clinical Infectious Diseases 2006

↑ conférence de consensus



Schwartz et al. Am J Public Health 2013

- les débuts du programme
- des médecins non formés
  - une méthodologie imparfaite (interim vs comprehensive treatment)
  - entre audace et sérendipité...

## France had a big heroin epidemic in the 1980s and '90s. Here's how the country fixed it.

The US, facing its own opioid crisis, could take similar action.

By German Lopez | @germanlopez | german.lopez@vox.com | Apr 17, 2018, 11:50am EDT

HEALTH



### How France Cut Heroin Overdoses by 79 Percent in 4 Years

And the United States could, too


OLGA KHAZAN APR 16, 2018



# Les TSO en France et ailleurs : que dit l'histoire ?



facteur de risque de mésusage, de polyconsommation et d'overdose



## le bilan en 2018


- **pérennité du modèle français ?**
- une grande hétérogénéité : **accès, pratique**
- **mieux évaluer et prescrire / évolutions** (polyconsommations, pathologies intriquées, populations concernées, portes d'entrée...)
- **formation initiale et continue**

# La méthadone aux USA : que dit l'histoire ?

- utilisée comme MSO et antalgique
- une diffusion historiquement large

Within the last 10-15 years, though, methadone has been increasingly used to manage neuropathic pain and cancer pain, but its use is causing an alarming number of deaths in the U.S. Last June, The Charleston Gazette ran a series titled "The Killer Cure" by Scott Finn and Tara Tuckwiller that found that **number of Americans whose deaths were caused by the methadone rose from 790 in 1999 to 2,992 in 2003**. The series also reported other statistics from the National Center for Health Statistics that revealed that West Virginia ranked first per capita in methadone overdose deaths, and that **methadone was more likely involved in overdose deaths than any other prescription drug**.


Methadone has several unique properties that can be beneficial in the treatment of neuropathic pain and cancer pain unresponsive to other opioids, but **some of these properties make it very dangerous and difficult to prescribe properly. As a result of these factors, methadone should not be the first-choice drug for pain and it should not be used in opioid-naive patients**. The goal of this article is to provide a review of the **properties and protocols for safe prescribing of methadone** to help physicians recognize situations where this drug offers the greatest advantage as an analgesic.



# Les TSO en France : place de la méthadone

## TSO : taux de couverture

- un des plus élevés au monde
- part croissante de la méthadone (1/3)
- faire mieux ? / éviter de dégrader ?




au détriment de la qualité :  
prescription, cadre, supervision



## RECOMMANDATIONS

Dematteis et al. Expert Opin Pharmacother 2017



# Cas particulier du sulfate de morphine


## Note d'information de JF Girard, DGS, 27 juin 1996

"...la poursuite de traitements utilisant le **sulfate de morphine**, dans le cadre de traitement de substitution, **n'est tolérée que jusqu'au 30 juin 1996** pour assurer un relais par les médicaments validés pour cette indication : la Méthadone et le Subutex.

Cependant **à titre exceptionnel**, en cas de **nécessité thérapeutique** (CI, inadaptation des ttt à la Méthadone et au Subutex aux besoins des patients), lorsque l'état du patient l'impose, la prescription de médicaments utilisant le sulfate de morphine à des seules fins de substitution, peut être poursuivie **après concertation entre le médecin traitant et le médecin conseil**, conformément aux dispositions de l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale.


L'ordonnance... devra porter la mention manuscrite : **"concertation avec le médecin conseil"**. Le comité départemental de suivi des traitements de substitution sera informé du nombre de patients concernés."

- mal évalué, sous-estimé (salle de consommation)
- **ratio décès / usagers = le plus élevé**
- de nouvelles propositions pour aider les patients et les professionnels







# Objectifs et stratégies




# En pratique, maintenant



# En pratique, plus tard



# Une épidémiologie évolutive...



European Drug Report 2018:  
Trends and Developments

# ...qui nécessite information et formation




Be a part of our  
community response!



**PRESENTATION ON:**  
Tips for talking with your kids/friends  
Signs of an overdose,  
Learn about naloxone  
**FOLLOWED BY Q & A**

6:30PM-8:30PM  
Doors at 6PM  
**MAY 9**  
John Oliver Secondary  
Auditorium  
530 E 41st Ave.

Brought to you by:  
    



# En résumé et conclusion

## TROUBLE DE L'USAGE DES OPIOÏDES

- épidémiologie évolutive
- société, contexte
- **patients : population élargie, banale**
- **produits (type, accès)... banalisés**

## NALOXONE

ne pas pêcher par  
excès de prudence

- facile (en spray)
- sans risque (sauf syndrome de sevrage)
- si inefficace (donne des pistes)
- => **accès le plus large possible**
- => **du précaire +++ / au douloureux**  
"libre accès" / vertu éducative

## AGONISTES OPIOÏDERGIQUES

### Buprénorphine / Méthadone

- prévention des overdoses
- **buprénorphine > méthadone**
- **mieux évaluer, mieux prescrire**
- **un modèle français menacé**
- **promouvoir les évolutions, RdRD**  
mésusage, détournement / facilité, adhésion

### Autres agonistes opioïdiques

- douleur : porte d'entrée
- **prévenir, repérer** (sujets à risque)
- **diagnostiquer** (addiction, douleur)
- **traiter** (addiction, douleur)
- **généraliste** et **pharmacien** en 1<sup>ère</sup> ligne

**INFORMATION / PREVENTION** (population générale, usagers, patients, soignants)

**FORMATION initiale et continue** (addictions, douleur, sommeil, souffrance psychique, etc...)

EVALUER - REEVALUER